J. 211.
ch. 2.

32696/D

N. XI
18/l

LEDERMÜLLER, Martin Frobenius

Von Lederwüller

Versuch,
beÿ angehender Frühlings Zeit
die
Vergrösserungs Werckzeuge
zum
nüzlich u. angenehmen Zeitvertreib
anzuwenden.
von
dem Verfasser der Mikroskopischen Gemüths u. Augen
Ergözung.

Nürnberg
Im Verlag, beÿ A. L. Wirsing, Kupferstechern u. Kunsthändl.
1764.

Essai,
d'employer les Instruments Microscopiques
avec
Utilité et Plaisir
dans
La Saison du Printems
par
l'Auteur des Amusements Microscopiques
tant des Yeux que de l'Esprit;
traduit de l'allemand par
I.C. Harrepeter Maitre ès Arts

à Nuremberg chez A.L. Wirsing, Graveur.
1764

M.F. Ledermüller delin. et Scrib. *A.L. Wirsing Sculp. et excud. Norimberg.*

TABULA I.

ein

kleiner Aſtzweig

mit der Blüthe

eines

Rubiner Apfelbaums;

nebſt einigen andern

Mikroſkopiſchen Theilen

deſſelben.

Es wird mir erlaubt ſeyn bey der Erklärung dieſer Tafel, dermalen nur mein vorzügliches Augenmerk erſtlich auf die Auslegung und Beſchreibung derer darauf vorgeſtellten Bilder überhaupts, ſodann aber noch insbeſondere, zur Erläuterung und Vorſtellung des wahren Beſtandtweeſens und der innern Theile derer Stiele, zu verwenden, als wovon noch immer ein gelährter Widerſpruch ſich unter denen beſten Naturkündigern ereignet; maſſen von einigen behauptet werden will, als wären die Faſern der Fruchtſtiele, nicht hol, dahingegen von andern das Gegentheil um ſo ſtärker erwieſen wird: Die Erklärung aber der Holzſcheibe fig. 16. 17. 18. biß zur nechſtfolgenden Vierdten Kupffertafel anſtehen zu laſſen; zumalen ohnehin auf ſelbiger ein Segment von dem Holz des Birnbaums, erſcheinen wird; wobey ich ſowohl die Beſchaffenheit des Apffel- als des Birnholzes und ſeiner Beſtandttheile, zu gleicher Zeit, um ſo ausführlicher werde anzeigen können, je mehr ich ohnehin Plaz und Raum vorräthiger finde, als ich bey gegenwärtiger Erſten Ausgabe nicht übrig ſehe.

Und weilen auf denen meinſten folgenden Tafeln Blumen und Blüthen vorgeſtellt ſeyn dörften, ſo habe ich es für das bequemſte Mittel angeſehen, theils zu Erſpahrung des Raums, theils zu Umgehung einer verdrüßlichen Wiederholung bekannter Warheiten, dasjenige mit einmal vorauszuſetzen und allhier mit anzumerken, was allen Gönnern und Liebhabern ſolcher Beobachtungen, bey der Zergliederung der Blumen überhaupts, zu wiſſen, nicht undienlich ſeyn wird. Nemlich die Befruchtungs-Werkzeuche der Bäume, Pflanzen, Stauden und Blumen; und zwar nach Anleitung des Linnäiſchen Syſtems, ohne andern hierdurch das mindeſte vorzuſchreiben, wel-

TABLE I.

une

PETITE BRANCHE

AVEC LA FLEUR

d'un

POMMIER

ET QUELQUES AUTRES

DE SES

PARTIES MICROSCOPIQUES.

Il me ſera permis pour cette fois, de fixer mon attention dans l'Explication de cette Table, prémiérement ſur l'éclairciſſement & ſur la déſcription des figures généralement y repréſentées, et après ou particuliérement ſur l'illuſtration et repréſentation de l'Eſſence et des Parties intérieures des queües des fruits et cela d'autant plus, qu'il y a encore des contradictions parmi les Phyſiciens, deſquels les uns aſſurent que les filets intérieurs ou les petits tuyaux des Queües n'étoient pas creuſes ou caves; les autres en révanche prouvent le contraire avec plus de raiſon: il me ſera permis, dis je, de rémettre l'Explication de la Fig. 16, 17, 18, qui préſente la moitié d'un Rondeau de ce bois, coupé en travers, à la quatriéme Table, parce qu'il y parôitra encore un Segment horizontal du Bois du Poirier, où je ſerai en état, de pouvoir plus amplement éxpliquer, tant la conſtitution du Bois du Pommier, que du Poirier et de ſes Parties éſſentielles, d'autant plus que j'y trouverai plus de place et éſpace, que je n'ai dans cette prémiére partition.

Et comme il ſe pourroit bien, que la plûpart des Tables ſuivantes ne repréſenteront que des Fleurs, j'ai jugé à propos tant pour épargner la place, que pour ne pas repéter inutilement des vérités conües, de ſuppoſer et éxpliquer une fois pour toutes, ce qui pourroit être de quelque utilité aux Amateurs de ces Obſervations, en diſſéquant des Fleurs. Savoir les inſtruments pour faire fructifier ou fertiliſer les Arbres, Plantes, Arbriſſeaux, et les Fleurs, et même ſelon le Syſtême de Linnæus, ſans pourtant vouloir par-là donner des

welche eine andere Eintheilung sich zu machen beliebt und unter den neuesten, die Ordnung der Monophyten, Dyphyten und Hermaphroditen erwählt haben.

Ich meines wenigen Orts bin bis daher bey folgender Einrichtung am sichersten gewandelt, wann ich die Blumen

1) in Männliche 2) in Weibliche und 3) in Zwitter abgesondert habe.

Denn ein jede Blume hat einige von diesen Geschlechtstheilen oder beede zugleich.

Es sind aber die **männlichen** Geschlechtstheile, die **Stamina** oder **Antheren**, so aus 3. Stücken bestehen:

a) Aus denen Filamenten oder Staubträgern.
b) Aus denen Staubsäckgen oder Staubbeuteln und
c) dem Antherenstaub, Blumen oder Befruchtungsstaub, der in diesen Antheren Säckchens enthalten ist.

In denen **weiblichen** befindet sich
Der Pistill.
Auch dieser hat drey Theile:

α) Das Ovarium, Germen, oder den Uterum und Eyerstock; auf diesem steht

β) der Stilus und an dessen obersten Spitze ruhet

γ) das Stigma oder Wärzgen.

In denen **Zwitter-** oder **Hermaphroditen-Blumen**, findet man die **männ-** und **weiblichen** Geschlechts-Theile zusammen, wie aus folgenden Vorstellungen sich alles deutlicher ergeben wird.

Linnäus sezt noch zweyerley Arten bey, nemlich
1) die Androgynas und
2) Hybridas.

In den erstern sind Mann und Weib zugleich, in denen andern aber männ- und weibliche Zwitter beysammen.

Von welchen ebenfalls an seinem Ort, die besten Beyspiele zur Erläuterung mit vorgestellet werden sollen.

Die übrigen Theile der Blumen, sind die Corolla oder die Blätter-Krone und der Becher. Calix.

An der Corolle kommt zu betrachten vor,
a) Das Nectarium.
b) Die Petala.

Der

Loix à ceux, qui voudroient adopter un autre Systême, par exemple l'ordre des Monophytes, Dyphytes et Hermaphrodites.

Qant à moi, je me suis bien trouvé iusque là en divisant les Fleurs

1) en mâles, 2) fémelles, et 3) Hermaphrodites.

Car chaque fleur a quelques unes de ces parties génitales ou les possede toutes à la fois.

Les Parties génitales mâles, sont les Etamines, Stamina ou Anthêres, qui sont composées de trois parties, savoir

a) des Filaments d'Anthêres,
b) des Capsules ou Bourses de la Poudre anthêrique
c) de la Poudre de l'Anthera, des Fleurs ou de la poudre de la fécondité, qui se trouve dans ces Bourses anthêriques.

Dans les Parties génitales *fémelles* on voit
le Pistille
qui a trois parties éssentielles,

α) l'Ovaire, Germen ou l'Utricule, là-dessus se tient

β) le Style, à la derniére extrêmité duquel se répose sur la pointe ou sommet du pistille

γ) le Stigme ou la *Verrüe*.

Les Parties génitales mâles et *fémelles* sont mélées dans les *Fleurs Hermaphrodites*, comme la repréfentation suivante montrera clairement.

Linnaeus y joint encore *deux* Sortes, savoir
1) les Androgynes; Androgynas,
2) Hybrides; Hybridas.

On trouvera dans les prémières, *mâles* et *femélles* à la fois, et dans les secondes des *Hermaphrodites mâles et fémelles*.

On parlera en son tems et lieu de toutes ces éspéces, et produira les meilleurs exemples néceſſaires, pour leur explication.

Les autres Parties des Fleurs sont la Corolla ou le Corail, & le Calix ou la Coûpe.

Il nous vient d'observer au Corail
a) le Nectaire et
b) les Pétales.

Le

Der Calix oder Becher hat entweder 1) ein Perianthium oder 2) Involucrum, 3) oder Amenthum, 4) Spatham, 5) Glumam oder 6) Calyptram.

In und auf oder um diesen Becher stehen nun die Petala die Stamina und der Pistill.

Sobald die Befruchtung vollbracht ist, so verwelken erstlich die Stamina, und dann die Corolla. Das Stigma vertrocknet und fällt mit dem stilo vom Eyerstock ab. Dann erscheint

der Uterus oder der Eyerstock alleine, und wird täglich grösser. Er ist das Behältnus der Embryonen und künftigen Früchte oder Saamen. Kommt derselbe zu seiner Reife, so heißt er

die Frucht, Fructus, und diese hat alsdenn ihr Pericarpium welches bestehet entweder 1) aus einer Capsula oder 2) Siliqua, 3) Legumine, 4) Nuce, 5) Drupa, 6) Pomo, 7) Bacca, 8) Conceptaculo, 9) oder Strobilo. Zu deutsch aus Schaalen, Schotten, Hülsen, Nüssen, Kastanien, Trauben, Aepfeln, Beeren, Tannenzapffen und andern Saamenbehältnussen.

Wird die Frucht aus ihren Hüllen genommen, so erscheint sodann der Kern als das wesendlichste Hauptstück der künftigen Fortpflanzung, nemlich der Saame. Dieser hat wieder sein Seminulum oder seinen Keim, und so klein dieser ist, so scheinet doch unwidersprechlich zu seyn, daß das ganze Werk der Befruchtung, von der Natur, vom Anfang der Blüth biß zur Reife der Frucht, bloß um dieses edelsten Theiles, ich meyne des Keims wegen, verrichtet werde.

Ich schmeichle mir, hiemit für bloße Liebhabere genug vorausgesagt zu haben, und ich werde daher nichts weiters übrig haben, als nunmehro die Erklärung der Kupfertafel selbsten vor die Hand zu nehmen, um meinen g. L. Gelegenheit zu geben, obiges alles, bey der praktischen Untersuchung selbsten, mit Nutzen anwenden und gebrauchen zu können.

Fig. 1. Ist ein kleiner Astzweig von einem Apfelbaum, dessen reife Frucht in der Herbst-Sammlung vorkommen wird, und gehört in die Classe der sauern oder kleinern Rubiner Arten. Er ist in natürlicher Grösse abgebildet, mit zwey offenen Knospen, davon die obere als eine **Tragknospe** mit a. noch geschlossene mit b. aber etwas geöffnete Blumen der Apfelblüthe, zeigt: c. bemerkt den Ort der Blume woraus der Apfel wird,

Le Calix ou la Coûpe a ou 1) un Perianthium, ou 2) Involucrum, 3) Amentum, 4) Spatham, 5) Glumam, ou 6) Calyptram.

En dédans, dessus ou au tour de cette Coûpe, se trouvent les Pétales, Stamina et le Pistille.

Aussitôt que la fructification est achevée, alors les Stamina commencent à se fâner, comme aussi le Corail. Le Stigme se desséche et tombe avec le Style de l'Ovaire.

l'Utérus ou l'Ovaire seul paroît alors, et grossit de jour en jour. Il est le réceptacle des Embrions, des Fruits à venir et de la Semence. S'il parvient à sa maturité, on l'appelle

le *Fruit*, Fructus, et celui a pour lors son Péricarpium, qui consiste ou 1) d'une Capsula, 2) Siliqua 3) Legumine, 4) Nuce 5) Drupa 6) Pomo 7) Bacca 8) Conceptaculo, ou 9) Strobilo, cela veut dire 1) Capsule 2) Silique 3) Légumes 4) Noix et Marons 5) Grapes 6) Pommes 7) Bayes ou Graines 8) Pommes de Pin et des autres Gardes Semence.

Si l'on ôte le fruit de ses enveloppes, alors on voit le Pepin ou le Semen, qui fait la partie la plus éssentielle de la future multiplication ou propagation, savoir la Semence. Celle ci a encore son Seminulum ou Germe, et quoiqu'il soit fort petit, il paroît pourtant être incontestable, que la Nature des le commencement de la Fleur iusqu'à sa maturité, ne travaille, que par rapport à cette partie, je veux dire, le Germe, ou Tendrillon.

Je me flatte d'en avoir assès dit pour les Curieux, c'est pourquoi je vais expliquer les Planches mêmes, pour donner à mes Lecteurs occasion de faire usage de tout ce que j'ai dit ci-dessus, dans l'Examen, que je veux instituer.

Fig. 1. Une petite branche d'un Pommier, dont le fruit meur paroîtra dans la Collection de l'Automne, et qui doit être mis dans la Classe des Espéces acides ou petites pommes Rubis. Cette Branche est dessinée dans sa grandeur naturelle, avec deux boutons, dont l'un en s'ouvrant pousse la fleur, l'autre seulement des feuilles; celui d'en haut, représente des fleurs encore

fer-

wird, mit seinem Kelch, der fünf Kronenspitzen hat, in welchem sonst die 5. Petala oder Blätter der Blüthblume, der Pistill und die Antheren, zu stehen pflegen, hier aber ausgefallen sind. Mit d. hingegen, ist nur eine Blätterknospe angemerkt, welche nichts als Blätter enthält, deren gemeiniglich zwölf beysammen liegen.

Fig. 2. 3. Machen die Theile der Blüthe deutlicher in zwey offenen Blumen, ebenfalls in natürlicher Grösse abgeschildert. Ihre Farbe ist angenehm, indeme sie theils ihrer blendenden Weise, theils ihrer reizenden Rosenfarbe wegen, dem Auge ein lockendes Ansehen giebet. Fünf oben breit und halb runde gegen die Mitte oben spitzig zulauffende Blätter, prangen mit dieser lieblichen Farbe und stehen in dem Becher auf der obersten Fläche des Uteri des Eyerstocks oder der jungen Frucht. In der Mitte desselben umschliessen sie den Pistill, der oben ein braungelbes Stigma oder Wärzgen hat, nebst zwanzig Staubträgern oder Antheren S. fig. c.

Fig. 4. Stellet einen Antherenträger noch geschlossen und denselben

Fig. 5. geöffnet vor durch No. 5. mit seinen gedoppelten Beuteln und Befruchtungsstaub, den

Fig. 6. abbildet wie er ungenezt durch No. 5. und

Fig. 7. wann er in einen Tröpfgen Wasser liegt, anzusehen ist; vergrössert durch No. 1.

Ich behalte mir bevor, des ehestens meine Erfahrungen vom Befruchtungsstaub, bey künftiger Erklärung der folgenden Tafeln, nachbringen und zeigen zu dörfen; daß man auch mit denen besten Gläsern, deutschen und Englischen, das nicht sehen kan, was Herr Dr. Hill in London, an diesem Blumenstaub will beobachtet haben, daß nemlich in denen Häutgens dieser Staubkugeln, kleine Keimchen enthalten seyn, und im Wasser hervortretten sollen.

Vielmehr werde ich meinen g. L. das wahre Bestandweesen dieser zarten Theilchen, auf eine ganz andere Art und so deutlich und gründlich vorstellen, daß ein jedes Auge, das mit seinen Vergrösserungs-Werkzeuchen behörig umzugehen weiß, mir Beyfall geben wird.

Fig. 8.

fermées ou boutons de fleur, a. et b. des fleurs ouvertes. c. designe l'endroit de la fleur, laquelle devient en Pomme, avec sa Coûpe, qui a cinq pointes en forme de Couronne, dans lequel on trouve autrement les 5 Pétales ou feuilles de la fleur fleurissante, le Pistille et l'Anthera, mais qui manquent ici; la figure d. au contraire montre un bouton, qui ne contient que des feuilles, come j'ai déja dit, dont douze sont couchées ordinairement ensemble.

Fig. 2. 3. rend les parties des fleurs plus intelligibles en deux fleurs ouvertes, de même dessinées dans leur grandeur naturelle. Leur couleur est agréable, puisqu' elle donne aux Yeux tant par son apparence éblouissante de blanc, que par les charmes de sa couleur de rose, un regard attirant. Cinq feuilles, qui en haut sont larges et à moitié rondes, mais qui vers le milieu aboutissent en pointe, se distinguent par cette charmante couleur, et se tiennent à la Coûpe sur la derniére superficie de l'Uterus, de l'Ovaire ou de l'Embrion. Elles enferment dans le milieu de la Coûpe le Pistille, qui a en haut un Stigme ou une *Verrüe* jaune ou brunâtre, avec vingt Antheres, voyès la Fig. c.

Fig. 4. représente un Porteur de l'Anthera, avec ses bourses encore fermées.

Fig. 5. le même ouvert avec ses doubles bourses pleines de la poudre fructifiante, et augmenté par la lentille Nr. 5.

Fig. 6. montre la poudre d'Anthêres, commeelle est à voir seche et

Fig. 7. l'observe dans une petite goutte d'eau en Microscope par une Lentille Nr. 1.

Je me réserve de publier mes expériences de la Poudre fructifiante dans l'explication des Tables suivantes, et de montrer, que l'on ne peut pas voir avec les meilleures Lentilles Allemandes ou Angloises, ce que Mr. le Docteur *Hill* à Londres a voulû avoir observé en cette Poudre des fleurs, savoir, que dans les peaux de ces petits globules de poudre se trouvoient de petits Germes, qui poussoient dans l'eau.

Je ferai au contraire voir à mes Lecteurs la Substance réelle de ces tendres parties, et cela d'une maniere si claire, distincte et solide, de sorte qu'un Oeil, qui sauroit se servir, comme il faut du Microscope, sera du même sentiment, que moi.

Fig. 8.

TAB. I.

Fig. 1.

26.

25.

a

b

c

b

c

d

13.

14.

2.

3.

10.

9.

11.

12.

5.

4.

7.

8.

6.

21.

22.

23.

15.

19.

16.

17.

20.

24.

18.

M.F.Ledermüller delin.

A.L.Wirsing Sc. et excudit Norimberg 1764

Fig. 8. Iſt der erſte Stof des künftigen Apfels oder das Saamenbehältnus der Apfelkerne, worauf

Fig. 9. die gewöhnlichen Piſtille ſtehen.

Fig. 10. Vergröſſert einen ſolchen Piſtill durch die ſchwächſte Vergröſſerung, und zeigt ſein Wärzgen in herzförmiger Geſtalt, die beeden

Fig. 11. und 12. zeigen, wie ſich dieſe mit dem Eyerſtock verhalten, und wie ſie denen Embryonen oder Saamenkernen, durch ihre hinablauffende Saft-Röhrgens, die Nahrungsſäfte zum Wachsthum zu führen.

Fig. 13. Gibt ein noch junges Apffelblat von ſeiner obern und

Fig. 14. von ſeiner untern Fläche zu erkennen, und zwar beede in natürlicher Gröſſe und Farbe. Die unterſte Seite iſt mehr weiß als grün, und ſtark mit kurzer feiner Wolle bedeckt, die aber bey genauer Unterſuchung, nichts anders als beſondere Gefäße ſind, welche entweder die Stelle der Dunſtlöcher verſehen oder Saugrörchen ſeyn mögten; wovon an ſeinem Ort das weitere gezeigt werden wird.

Fig. 15. Bemerket ein ſehr kleines Zwergſchnittgen von einen Zweig dieſes Apffelbaums, in natürlicher Größe, und zwar nur im halben Durchſchnitt. Dieſes zeigt ſich

Fig. 16. 17. auf zweyerley Art vergröſſert, indeme die 16. Figur daſſelbe durch No. 4. Engliſch Glas betrachtet, die 17te aber durch Numer 2. und alſo um vielmal ſtärker vergröſſert, nebſt dem Mark Fig. 18. abbildet.

Die g. L. wollen mir erlauben, daß ich die ſämmtlichen Theile und Gefäße des Holzes, ſein Mark ſamt der Rinde, mit denen Fibern, Fibrillen, Faſern, Tracheen, Spiral-Gefäßen, Utrickeln ꝛc. ihren Nuzen und ihre Beſtimmung, biß zu der auf der vierdten Tafel nechſtens vorkommenden Abbildung und Erklärung des Birnbaum-Holzes, nach Anleitung der berümteſten Naturforſcher ſowohl als was mich die eigene Erfahrung belehrte, verſpahren darf, weil mir der Raum des Pappiers unter der Feder verſchwindet.

Ich ſchlieſſe daher die Erklärung dieſer I. Tafel mit der Beſchreibung der übrigen Figuren, welche den Bau der Stiele erläutern ſollen.

Ich nahm, um gewiß zu erfahren, ob die Faſern in denen Stielen hol ſind, eine noch junge Frucht, ſo noch nicht 14. Tage alt ware, Fig. 19. friſch vom Baum, ſammt ihrem Stiel, und theilte den kleinen Apffel Fig. 19. an welchen noch die Staubträger Fig. 20. wiewohl verwelkt, deutlich zu ſehen waren, nach der Länge vom Stiel herab, in zwey gleiche Theile. Hier erblickte ich zu meiner beſondern Verwunderung S. Fig. 21. die weiſſen Embryonen der Saamenkerne, nicht allein

Fig. 8, Eſt la prémière étoffe de la Pomme à venir ou le garde-ſemence des Pepins, ſur lequel

Fig. 9. on trouve les cinq Piſtilles comme à l'ordinaire.

Fig. 10. Groſſit un tel Piſtille par la plus petite Lentille, & montre sa petite Verrüe en forme de Cœur, lès deux

Fig. 11. & 12. repréſentent la rèlation, corréſpondance ou rapport, que ceux-ci ont avec l'ovaire, & comme ils donnent aux Embrions, par leurs tuyaux, qui deſcendent, le ſuc nourricier, néceſſaire à leur Végétation.

Fig. 13. Fait voir une jeune feuille du Pommier en deſſus &

Fig. 14. en deſſous, & même toutes les deux dans leur grandeur & couleur naturelle. Le côté inferieur eſt plus blanc que verd, & tout couvert d'une Laine courte & fine, mais laquelle en l'examinant de plus près n'eſt que des Vaſes particuliers, qui remplacent ou les Pores, ou les Tuyaux deſtinés à ſuccer, & tranſpirer, desquels on parlera plus amplement en ſon lieu.

Fig. 15. Explique une très petite portion d'une Branche de ce Pommier, dans ſa grandeur naturelle, & même dans un demi Diamètre, cela ſe montre

Fig. 16. & 17. groſſi de deux façons, la figure 16. le préſentant par une Lentille Angloiſe N. 4. la 17ème au contraire par Num. 2. & par conſéquent beaucoup plus groſſi, avec la Moëlle fig. 18.

Je ſupplie les Amateurs, de vouloir bien m'accorder la permiſſion, de rémettre toutes les Parties & Vaſes du Bois, ſa Moëlle avec l'Ecorce, ſes Fibres, Fibrilles, Chevelures, Trachées, Soûpiraux, Vaſes, Utricules, leur Utilité & Deſtination, juſqu'a l'illuſtration & repréſentation du Bois du Poirier ſur la quatriéme Table, tant ſelon l'inſtruction de plus celebres Phyſiciens, que ſelon ma propre expérience, puiſque je n'ai plus de place ici.

C'eſt pourquoi je finis ici l'Explication de cette prémière Table par la Deſcription des autres figures, qui doivent éclaircir la ſtructure des Queues.

J'ai pris, pour être aſſuré ſi les Fibres des Queues ſont creuſes ou caves, un jeune fruit, qui n'avoit pas encore quinze jours fig. 19. tout verd, de l'arbre, avec ſa queue, & j'ai partagé la petite Pomme fig. 19. à laquélle on pouvoit encore voir diſtinctement les Anthêres fig. 20. quoique fanés, tout le long de la queue en deux parties égales. Là je m'appercevois à mon très grand étonnement fig. 21. des Embrions blancs des

alleine schon völlig gebildet, sondern auch fast grösser, als sie gemeiniglich sind wann sie reif worden, wovon ich bey der Betrachtung des Kirschen- und Pflaumenkerns, die Ursache anzeigen werde.

Biß dahin habe ich allhier den Durchschnitt nach der Länge eines solchen jungen Apfel-Saamenkerns mit seinem schon sehr grosen Keim, vorgestellet, dessen Bestandtheilchen aus einem Zellen-Gewebe 6. eckichter Bläschen, bestehet. S. Fig. 23. Die Figur 22. zeigt den weissen Embryo ganz, in natürlicher Gröβe erst 14. Tag alt. Als ich den Stiel erstlich mit dem Suchglas übersahe, erblickte ich schon eine Menge feiner Fäden beysammen. S. Fig. 24. Ich nahm vermittelst eines guten Handglases und einer zarten Nadel, eine von diesen Fasern nach der andern heraus, legte sie in verschiedene Schiebergläschen, und betrachtete Fig. 25. durch alle Vergrösserungen. Die

Fig. 26. zeiget was ich gesehen habe, und zwar durch Numer 00. Streicherisch Glas. Denn an statt ich vermeynte eine dicke Röhre, gleich einem vergröserten Haar, zu sehen, entdeckte ich vielmehr an dieser vermeyntlichen einigen Faser, einen ganzen Büschel solcher Haarröhrchen, welche zum Theil gerad, zum Theil gewunden wie ein Drat, sich dem Auge zeigten. Dergleichen gewundene oder Spiral-Röhrchen auch in vielen andern Pflanzen und besonders in den Blättern des Rockens, oder im Stroh, erscheinen.

Sie sind aber alle hol, und nichts ist gewisser als daß es Röhrchen sind, welches auch ihre Durchsichtigkeit bestättiget.

Sie sind mit Utriculis untermischt, und die undurchsichtigen Punkten, so dunkel oder opack anzusehen, halte ich für Theilchen des Marks oder Fleisches, womit die Interstitia oder Zwischenräumchen der Stiele, ausgefüllet sind. GOtt! welch ein armes Ansehen macht nicht ein solcher Obst- oder Fruchtstiel vor den blosen Augen! und welche unaussprechliche Weißheit des Allmächtigen, liegt doch in diesem so kleinen und geringen Umfang verborgen!

Wollten einige g. L. sich vielleicht gefallrn lassen, vorstehende Beobachtung ebenfalls zu prüfen und zu untersuchen, so bitte ich zum voraus, auch hierzu, wie ich gethan, junge Früchte zu erwählen, deren Stiele noch voll Saft und nicht vertrocknet sind; alsdenn wird es ihnen auch niemalen mislingen, bey eben so vieler Gedult als mir dabey möglich gewesen, die richtigsten und sichersten Erfahrungen zu machen. Sollten auch anfänglich die Röhrchen nicht gleich durchsichtig erscheinen, so wird nichts nöthig seyn, als nur so lange zu warten, biß der darinn befindliche Saft, sich verlohren hat, welches in einer Zeit von wenigen Minuten erfolgen muß.

Der weitere Nutzen und die Bestimmung der Stielfibern, soll bey der Beobachtung der Frucht in der Herbst-Sammlung g. G. gezeigt werden.

Pepins, non seulement déja tout formés, mais je les trouvois encore plus grands, qu'ils ne le sont communement, quand même ils sont parvenus à leur maturité, dont j'indiquerai la raison dans l'observation du Noyau de Cerises & Prunes.

Jusque-là j'ai représenté ici le Diamètre selon la longeur d'un tel jeune Pepin, avec son Germe déja fort grand, la substance duquel consiste en un tissu des Vésicules en forme de cellules héxagones, voyès fig. 23. la fig. 22. montre l'Embrion blanc en entier dans sa grandeur naturelle, âgé de 15. Jours. Comme je régardois d'abord la Queue avec la Lentille, je m'appercevois déja d'un tas de filets fins, v. fig. 24. J'ai tiré par le moyen d'une bonne Lunette & fine aiguille l'un apres l'autre de ces filets, les ai mis en plusieurs verres, & les ai observé fig. 25. par toutes les Lentilles.

La Fig. 26. démontre ce que j'ai vû, & même par un Microscope de Mr. Streicher Num. 00. Mais au lieu d'y trouver, comme je m'étois imaginé, un Tuyau épais, réssemblant à un Cheveu grossi, j'y ai decouvert plutôt en ce prétendu unique filet, un paquet de ces Chévelures, qui se présentent à l'oeil en partie toutes droites, & en partie entortillées comme un fil d'archal. Ces sortes de soûpiraux paroîssent aussi en plusieures autres Plantes, & particuliérement dans les feuilles du Seigle ou de la Paille.

Il est donc constaté qu'ils sont creux, et de petits tuyaux, ce que confirme leur transparence.

Ils sont mêlés d'Utricules, et je prends les points obscurs et opaques pour des particules de la Moëlle ou Chair, avec lesquelles les Interstices des Queues sont remplis. Grand Dieu! quelle pauvre Mine fait une telle Queüe de fruit en la régardant simplement; et quelle Sageste inexprimable du Tout-puissant est pourtant cachée dans ce petit et miserable Circuit.

Si quelques uns de mes Lecteurs veulent faire l'épreuve de la susdite Observation, je les prie, de choisir pour cet effet de jeunes fruits, comme je l'ai fait, dont les Queues sont pleines de suc et non pas déssechées; de cette façon ils ne pourront que faire les meilleures & plus sûres expériences. Si en cas les petits Tuyaux ne paroîssoient d'abord transparents, alors il faudroit attendre, jusqu'à ce que le suc, qui s'y trouve, soit perdu, ce qui doit arriver en peu de Minutes.

Le reste de la destination des fibres de la Queüe suivra dans la partition de l'Automne, avec l'observation des fruits & leur anatomie.

TABVLA II.

TABULA II.

Ein Pflänzgen der Reseda.

Diese mikroskopische Blumenpflanze, welche Linnäus Reseda, Tournefort aber Luteota oder Sesamoides nennet, ist Liebhabern anmuthiger Garten-Gewächse viel zu bekannt, als daß ich hier eine weitläuftige Beschreibung derselben, entlehnen sollte. In Engelland ist sie, so viel mir von vornehmer Hand versichert worden, wegen ihres sanften und erquickenden Wohlgeruchs, fast in allen Zimmern anzutreffen, und ist besonders eine Lieblings-Blume des schönen Geschlechts, welches ihr auch den Namen Mignone d'Egypte unter andern mit beylegt.

Ein solcher Blumentopf, bestehet aus vielen einzeln Pflänzgen, welche denen Rosmarin-Stengeln ziemlich nahe kommen.

Diese Pflänzgen machen aus einer dinnen, langen, faserigten Wurzel, einen Schuh hohen auch längern Stengel, dessen untere Helfte zu beeden Seiten, Blätter, der obere Theil aber, Bluumen, an allen Seiten des Stengels trägt, die ein ungemein schönes Ansehen gleich dem niedlichsten Bouquet machen. Sie sind zum Theil an manchen Pflänzgen gröſſer.

Gegenwärtige Pflanze, habe ich in natürlicher Größe nachgebildet, so wie sie die 1. Figur getreulich vorstellet. Man siehet daran bey (a) die Blümgen deren öfters 40. 50. bis 60. an einem Stengel offen stehen, und täglich immer neue oder frische hervorkommen; bey (b) aber die Frucht oder Saamenkapseln, welche halb zugeschnürten Beutelgen ähnlich sehen.

Die 2te Fügur zeigt eines dieser Blümgen, nach der Höhe gerichtet, durch N. 6. vergrößert, und

Die 3te Figur eben dieselbe, nach gleicher Vergrößerung, und ganz ausgebreitet auch vorwärts gekehrt, um den Pistill zu sehen. Sie bestehen aber (c) aus dem in vier Abschnitte getheilten und auf dem grünen 6. blätterigen Kelch stehenden Nectario; Auf diesem braungelben Schüsselförmigen Nectario stehen die 40. Petala oder weissen Blälter der Corolle (d) je zehen und zehen neben einander, zwischen denen die Stamina oder Antherenträger (e) mit ihren feuerfarben Staubbeuteln hervorragen und den Pistill umgeben, an welchem man aber keinen Stiel wahrnehmen kan, sondern das dreyfach gedoppelte Stigma ruhet dicht auf dem Eyerstock, wie Fig. 9. deutlicher zeigen wird.

Die

TABLE II.

Une Plante de la *Reseda.*

Cette Plante microscopique, que *Linnaeus* nomme *Reseda*, et *Tournefort Luteota* ou *Sesamoides* est trop connüe des Amateurs des Plantes et Fleurs, qu'il n'est pas nécéssaire d'en faire une ample Description. On la trouve en Angleterre, comme des Gens de Qualité me l'ont assuré, à cause de son parfum & odeur douce, dans tous les appartements, & elle est surtout la Fleur favorite du Beausexe, qui lui a aussi donné le Nom de Mignonne d'Egypte.

Un tel Bouquetier contient plusieures Plantes, qui réssemblent assès aux tiges du Rômarin.

Ces petites plantes forment ou poussent, d'une racine fine, longue & cottoneuse, une Tige d'un pied de hauteur, & quelque fois plus haute, dont la partie inferiéure porte de deux Côtés des Feuilles, & la partie supériéure de tous les Côtés de la Tige des Fleurs, qui sont fort belles à voir, come le plus joli Bouquet. Elles sont en partie dans quelques Plantes plus grandes.

Pour la présente, je l'ai dessiné à la nature, telle que la Figure 1. la représente. On y voit Litt. a. les petites fleurs, desquelles souvent 40. 50. à 60. à une seule tige se trouvent ouvertes, & s'augmentent de jour en jour; mais litt. b. les Bourses de fruits ou Capsules de semence, qui ont la forme des Bourses à moitié serrées.

La fig. 2 montre une de ces petites fleurs regardée perpendiculairement, & grossie par la Lentille N. 6. comme aussi

La fig. 3, laquelle designe la même fleur, également grossie et totalement étendue, et tournée en avant, pour faire voir son Pistille. Chacune de ces fleurs contient les parties suivantes, savoir (c) le Nectaire divisé en quatre parties sur la Coupe verde de six feuilles. Sur ce Nectaire brun et jaunâtre, et qui a la forme d'un plat, sont les Pétales ou feuilles blanches du Corail (d) au nombre de quarante, dix à dix sur chaque feuille, parmi lesquelles les Etamines, stamina, ou Porteurs de l'Anthera, (e) couleur de feu s'avancent, & embrassent le Pistille, qui n'a point de style, mais trois doubles Stigmes ou Verrües, qui sont quasi collés sur l'Ovaire, comme la fig. 9. montrera plus distinctement.

La

Die 4te Figur bemerket einen Theil des Nectarii mit dem vierdten Theil der Corolle, auf welchen 10. weisse Petala stehen, so lang und schmal sind, sie kommen einem Federbusch-Polyp nicht viel ungleich.

Fig. 5. Legt den sechsblätterigen grünen Kelch, mit den braungelben Nectario und dessen vier Abtheilungen von oben oder innen, und

Fig. 6. Von aussen oder unten, nebst einem Theil des grünen Stiels, deutlicher vor die Augen.

Fig. 7. Sind zwey einzele weisse Blätter oder Petala der Carolle und

Fig. 8. Ein Staubträger mit seinen Pommeranzen oder feuerfarben-gedoppelten Antherensäckgen.

Fig. 9. Ist der Pistill, der anfänglich sechseckigt ist, dann ablang rund wird; mit dem Eyerstock, (f.) dem dreyfach gedoppelten Wärzgen, (g) und dem Nectario (h) worauf er in der Mitte stehet.

Fig. 10. Ist eben dieser Pistill in natürlicher Größe mit dem Kelch, die übrigen Figuren aber von 2. bis 14. sind durch die Linse Nro. 6. beobachtet und abgezeichnet.

Fig. 11. bezeichnet ein vergrößertes Saamenbehältnus, wenn es noch grün und halb reif ist, woran das Stigma sich geöfnet hat;

Fig. 12. ist eine geöfnete solche Frucht oder Saamenkapsel, um die Laage der nierenförmigen Embryonen sehend zu machen; davon

Fig. 13. Ein Saamenkorn in natürlicher

Fig. 14. aber in vermehrter Größe sehen lässet. Den Beschluß dieser Tafel macht endlich der Antherenstaub, der ohngefehr Gerstenförmig siehet, wie Fig. 15. bemerkt im Wasser, wie gemeiniglich, kugelförmig Fig. 16. wird, und ein öhlichtes Wesen im zerplatzen von sich giebt, wann man ihn durch die stärkste Vergrößerung betrachtet.

La fig. 4. observe une partie du Nectaire avec la quatrième partie du Corail, c'est à dire dix Pétales, qui sont blancs, longs, etroits, et ressemblent beaucoup à un Bouquet Polypétale.

La fig. 5. est la Coupe verde de six feuilles avec le Nectaire brun et jaunâtre, divisé en 4. parties, & observé en dessus ou en dedans, &

La fig. 6, la même en dehors ou en dessous, avec une partie de la queüe verde, mais

La fig. 7. designe deux feuilles blanches ou Pétales du Corail, et

La fig. 8. un Porteur de l'Anthera, avec ses doubles bourses spermatiques, couleur de feu ou d'Orange.

Fig. 9. Est le Pistille, grossi par No. 6. qui se montre au commencement comme un Hexagone, mais qui devient après oblong et rond, avec l'Ovaire (f) ses trois doubles Verrües, (g) & le Nectaire (h) sur lequel le Pistille est planté au Centre.

La fig. 10. est le même Pistille représenté naturellement avec la Coupe. Mais les autres figures depuis la 2éme jusqu'à la quatorziéme sont dessinées & observées par la Lentille No. 6.

La fig. 11. remarque une Capsule de Semence grossie, lorsqu'elle est encore verde & à moitie mure, à laquelle le Stigme s'est ouvert.

Fig. 12. est un tel fruit ouvert ou Capsule de Semence, pour faire voir la position des Embrions, qui ont la forme de Reins.

La fig. 13. présente un Embrion naturellement dessiné, mais

La fig. 14. un peu plus grossi. La Poudre fructifiante fera la fin de cette Planche, laquelle, étant seche, ressemble au blé, voy. la fig. 15, et quand elle est arrosée, devient ronde fig. 16. et en se crevant, rend de particules huileuses, quand on l'observe par les plus forts Microscopes.

TABULA III.

Die Gold- oder Feuer-Lilie.

Auch diese prächtige Blume, gehört wie die Reseda, in die Classe der Zwitter. Die Botanische Sprache nennet sie, Lilium cruentum, rubens, croceum, purpureum majus, aureum majus, Hemorocallis und Martagon &c.

Sie hat so viel betrachtenswürdiges an sich, daß obschon diese Tafel sehr reich an Figuren ist, es mir doch gar leicht gewesen wäre, noch eine ganze Platte damit anzufüllen.

Es wird mir erlaubt seyn die Ursache vorauszusetzen, welche mich bewogen hatte, diese Blume genauer zu betrachten.

An einem sehr schönen und frühen Morgen, da die aufgehende Sonne sich noch in Millionen und Millionen cristallenen Kugeln des erquickenden Thaues bespiegelte, sahe ich von Ferne aus dem Grunde der Kelche verschiedener dieser Lilien, etwas wie silberne Sterngen blitzen, welches ich an keiner andern Blume noch gesehen hatte.

Dieser

TABLE III.

Le Lis couleur de feu ou d'or.

Cette fleur brillante est encore une Hermaphrodite comme la Reseda. Messrs. les Botanistes la nomment Lilium cruentum, rubens, croceum, purpureum majus, aureum majus Hemorocallis, Martagon &c.

Elle possède tant de choses, dignes d'être regardées, qu'il m'auroit été fort facile, quoique cette Table est déja assès enrichie de figures, d'en remplir encore une Planche entiére.

Il me sera permis d'indiquer la raison qui m'a porté d'examiner cette fleur de plus près.

Un beau matin lorsque le Soleil se leva, j'ai vû de loin du fond des Coupes de plusieurs de ces Lis, réluire quelque chose comme des étoiles d'argent, ce que je n'ai pas encore observé en aucune autre fleur.

Ce

TAB. II.


Fig. 1.




2.



3.




4.




5.



6.




7.



8.



7.



9.



10.

11.



12.



13.



14.

15.



16.

M.F.L. del.

A.L.W. Sc.

Dieſer reitzende Blick, lockte mich, das Suchglas in die Hand zu nehmen, um den Ort gänzlich damit überſehen zu können, der mit dieſem beſondern Schmuck prangte.

Die weiſſen Haare, die Wolle oder Fäden, welche auf den hinterſten Theilen der ſechs Blätter und deren oberſten Fläche, mit dem bloſen Auge ſichtbar waren, erſchienen jetzo als ſilberne Sternchen.

Durch eine ſtärkere Vergröſſerung aber, ſiehet man purpurrothe und goldgelbe Säulen und Pyramiden, auf deren Spitzen, Kugeln mit Stern ähnlichen Strahlen blizten, ſo, wie der hellſte Criſtall durchſichtig und mit Laſur-Gold und Silber als das ſchönſte Schmelzwerk, (emaille) geſchmückt zu ſeyn ſchienen.

Ob nun ſchon dieſe Theile ſich viel ſchöner ſehen als beſchreiben laſſen, ſo ſchmeichle ich mir doch, ſie durch die Figuren F. G. H. I. nach aller Möglichkeit ſo geſchildert zu haben, wie ſie mir durch das Glas No. 3. vor das Geſicht gekommen ſind.

Ich will aber nunmehro die Kupfertafel ſelbſt, nach ihrer alphabetiſchen Ordnung erklären.

Fig. 1. zeigt eine ganze offene Blume oder Feuer-Lilie, in natürlicher Gröſe an welcher (a) die ſechs Petala oder Blätter (b) das Stigma mit ſeinen dreyfachen Wärzgen, (d) den Piſtill beſonders, mit dem dreyfachen Stigma, und (e) ſeinem Eyerſtock, dann mit (f) den etwas vergröſſerten Antherenſtaub. (g) Die weiſſe glänzende Wolle auf der Oberfläche der Blätter; (h) die grünen Stengelblätter, nebſt (i) etwas von dem Stiel oder Stengel der Blume; alles in natürlicher Größe.

Vergröſſert aber und zwar nur durch das Suchglas, bemerkt

A. die auf den 6. Blättern der Blume befindliche weiſſe Silberwolle (g) welche hier als Sterne zu ſehen.

B. Iſt das dreyfache Wärzgen oder Stigma, mit ſeinen Papillen und Oefnungen oder Rinnen, durch Nro. 5. beobachtet.

Fig. C. 1. 2. 3. Sind drey Antheren oder Staubträger, von verſchiedenen Seiten betrachtet, theils noch geſchloſſen, theils im aufſpringen begriffen, an Farbe dunkel Purpur braun.

D. Der Antherenſtaub trocken;

E. Eben derſelbe in einem kleinen Tröpfgen Waſſer, durch Nr. o o. als die höchſte Vergröſſerung abgebildet, mit einigen lebendigen Infuſions-Thiergen, ſo ich zu gleicher Zeit darunter wahrgenommen.

F. G. H. I. Die feine Silberfaſern oder Wolle. g. und A. durch Nro. 3. vergröſſert, mit ihren Sternähnlichen Pyramiden-Kugeln.

Ce regard charmant me porta à prendre la Lentille, pour en pouvoir obſerver l'endroit, qui étoit embelli de cette parure.

Les Cheveux blancs, la Laine ou les fibres, que l'oeil pouvoit voir ſur les derniéres parties & extrême ſuperficie des ſix feuilles, paroiſſoient actuellement comme de petites étoiles d'argent ſur des courtes Pyramides.

On s'appercoit au contraire en groſſiſſant l'objet, des Colonnes & Pyramides couleur de pourpre & d'or, aux bouts deſquelles luiſent des boules avec des rayons d'étoiles, qui étoient auſſi tranſparentes que le plus fin Criſtal, & qui ſembloient être ornées de l'or & argent azuré, comme le plus charmant Email.

Quoique toutes ces Parties ſe faſſent plus diſtinctement voir que décrire, je me flatte pourtant de les avoir deſſiné aſſès exactement, autant qu'il m'a été poſſible, par les figures F. G. H. I. comme elles me ſembloient être, en les regardant par la Lentille Num. 3.

Paſſons à l'explication de la Planche même.

Fig. 1. préſente la fleur ouverte ou le *Lis doré* dans ſa grandeur naturelle, à laquelle lit. (a) montre les ſix feuilles ou Pétales, (b) le triple ſtigme ou Verruë, (c) les Anthêres, (d) le Piſtille avec ſon triple ſtigme 1. 2. 3. (e) l'Ovaire, (f) la Poudre Anthérique peu groſſie, (g) la Laine blanche ſur les Pétales en forme d'étoiles argentées, (h) les feuilles verdes à la Tige, (i) & tout cela naturellement.

Mais groſſi ſeulement par la Lentille oeconomique, c'eſt à dire de trois pouces,

Fig. A. montre la Laine blanche argentée & étoilée.

B. La triple Verrüe avec ſes Papilles & tuyaux groſſie par la Lentille Num. 5.

Fig. C. 1. 2. 3. trois bourſes de l'Anthera repréſentées de differents côtés, fermées & ouvertes.

D. la Poudre de l'Anthera ſeche;

E. la même dans une goutte d'eau obſervée par Num. o o. avec ſes Parties ſubſtantielles ou liqueur fructifiante, & quelques animaux d'Infuſion, encore plus petits que les animaux ſpermatiques.

F. G. H. I. La Laine qui ſe trouve ſur les Pétales (g) fort augmentée, on voit ici des Pyramides étoilées couleur de pourpre, d'or & d'argent, reluiſantes & brillantes comme le plus fin Criſtal, (par la Lentille Nro. 3.)

K. Eine kleine Art Zwibeln, welche zwischen denen Achseln der Blätter, am Stengel häufig hervor zu kommen pflegt und täglich an Größe zunimmt.

K. Les petits Oignons de Lis qui se rejettent entre les feuilles verdes & la Tige.

L. Eine von dieser Zwiebel-Brut, welche ich in ihrer wahren Grösse abgezeichnet habe, und beynahe so reif ist, daß sie abfallen will. Sie hat bereits noch am Stiel ihr Wurzelkeimgen (o) ausgetrieben.

L. Un de ces Oignons, plus grand mais naturel & sans augmentation microscopique; il est presque mur & assès grand pour tomber, & commence déja à faire la Racine (o).

M. N. Sind die ersten und äussersten Schaalen-Blätter solcher Zwiebeln, in ordentlicher Größe, mit dem daran befindlichen erst ausgebrochenen Keim der Wurzel. o.

M. N. Sont les premiéres feuilles ou ecorces d'oignons, K. L. avec la jeune racine O. qui s'étoit poussée, lorsque l'oignon se trouvoit encore à la Tige.

O. Die junge ausgekeimte Wurzel.

P. Noch eine solche Zwiebel, ausser ihren zwey ersten Schaalen-Blättern.

P. l'oignon separé de ses ecorces ou feuilles premiéres M. N.

Q. Eben dieselbe nach der Länge herab durchschnitten, um die Lage der übrigen Zwiebel-Schaalen, sowohl als des Keims, sehend zu machen; jedoch ohnvergrössert.

Q le même detaillé perpendiculairement, pour faire voir la situation des autres feuilles & du Germe. R.

R. Der grüne Keim, der unten in diesen jungen Zwiebeln enthalten ist.

Weilen sich nun auch der Eyerstock (e) täglich vergrössert hat, so habe ich noch eine andere Abbildung desselben, vermittelst der

Et puisque l'Ovaire (e) grossit de jour en jour, je voulus présenter par les figures

Figuren S. S. sowohl von der Seite, als auch vor sich gerichtet, mit anfügen wollen, welcher äusserlich ein Zwölfeck, innerlich aber ein Sechseck vorstellet, mit sechs dreyeckichten Saamen-Zellen, in deren jeder 25. bis 30. Saamenkerne liegen, wie die Figur

SS. un ovaire ou une Capsule seminaire, presque meur en grandeur naturelle: C'est presqu'un Dodecagone en dehors, mais Hexagone en dedans, avec six espaces ou Cassetins de la semence.

T. eines von diesen sechs Samenfächern besonders und mit

T. Une de six Casettes ou espaces de la semence, remplie avec 25. à 30. Graines, de sorte que toutes les six, ou la Capsule entiére, portent souvant plus de 160. Graines de semence, dont

V. einen Saamenkern, der herzförmig stehet, in natürlicher Größe darstellet.

V. présente un de ces Grains naturellement designé.

Und dieweilen ich auch noch zu wissen verlangte, warum die Natur mit so vielen rothen Punkten, die äussere grüne Haut dieser kleinen Brut-Zwiebeln, gleichsam besprengt habe, so nahm ich, vermittelst eines feinen Federmessers, dieses äusserste Häutgen (Epiderme) ab und legte das Theilgen

Et comme je voulus aussi savoir, pourquoi la Nature avoit pourvû la peau verde exterieure de ces petits oignons, de tant de points rouges? pour cet effet j'ai ôté moyennant un Canif subtil, l'Epiderme, & j'ai observé la particule.

X. unter mein Vergrösserungs-Glas Nro. 5. Hier sahe ich mit ungemeinen Vergnügen ein grosses ausgespanntes Netz, von viereckigten Schlingen oder Schleifen geflochten, dessen Räume mit dunkel und hellrothen Rubinen, Schmaragden, Topasen und Diamanten, ausgefüllt zu seyn schienen.

X. Par le Microscope N. 5. Là je m'apperçevois à mon grand plaisir d'un vaste panneau étendû, entrelassé de noeuds ou Lacets quarrés, les intervalles desquels sembloient être remplis de Rubis, Emeraudes, Topases & Diamants.

In der That aber, entdeckte man hier sehr deutlich die verschiedenen Säfte, in diesem Zellen-Gewebe, davon einige purpurroth, rosenroth, sittiggrün auch gelb und weiß, zu sehen

Mais on y decouvroit en effet très distinctement, les differents sucs dans ces cellules, qui étoient à voir en partie, couleur de pourpre, de rose, celadon, jaunes

TAB. III.

C. 1.

C. 2.

c b c
c c
c c
c

Fig. 1.

a a

C. 3.

d
1 2
3

a

T.

c

V.

h

S.

Q

R.

P

a

K K.

F.

S.

h h

B.

M.

O.

N.

O.

O.

G.

A.

H.

I.

f

x.

z.

E.

D.

sehen waren. Sollte nicht die rothe Farbe der Lilienblätter, in diesem Urstoff, in dem roth und gelben Saft meyne ich, zu vermuthen seyn? zumalen auch in der äussersten Haut des ganzen Stengels, von der Zwiebel an in der Erde, biß zur Blume, diese rothen Punkten so wohl äusserlich an der Haut, als auch in denen Saft-Zellen und Utrikeln, innerlich gesehen werden können. Die

jaunes & blancs. Ne sauroit-on pas croire, que cette couleur rouge des feuilles de Lis étoit cachée dans cette première étoffe, je veux dire, dans ce suc rouge & jaunâtre? surtoût parce que ces points rouges peuvent être vû dans l'Epiderme de la Tige, dès l'oignons dans la terre jusqu'à la fleur, tant extérieurement à la peau, qu'intérieurement dans les cellules nourricieres & Vtricules.

Fig. Z. stellet das Häutgen X. nunmehro vergrössert durch Nro. 5. vor, mit seinen perpendikular und horizontal oder gerad und quer lauffenden Rörchen und Utrikeln, welche leztere in denen gefärbten Vierecken bestehen.

La fig. Z. Représente l'Epiderme (X) grossi par Num. 5. avec ses tuyaux & Utricules, qui le passent perpendiculairement & horizontalement, dont ces derniers, c'est à dire les Utricules, consistent en des Quarrés colorés.

Man hat aber solche Beobachtungen mit Zwiebeln anzustellen, welche noch ganz frisch am Stengel sitzen; denn so das Häutgen trocken ist, siehet man die geraden und schregen Röhrgen nicht mehr, welche die Vierecke machen; und die Mannigfaltigkeit der Farben verschwindet ebenfalls. Es wird also aus vorstehenden, die dreyfache Art der Fortpflanzung dieser Blume, nunmehro offenbar erhellen, nemlich

Mais en voulant faire cette expérience avec des Oignons, il n'en faut prendre que ceux qui sont encore verds à la Tige; car aussitôt que l'Epiderme est devenu sec, alors on ne voit plus les Canaux perpendiculaires & horizontales, qui forment les Quarrés, & la diversité des Couleurs disparoit de même. Ce que j'ai dit, sera suffisant à faire connoître la triple manière de la Végétation de cette fleur. Elle se fait

1) Aus der Haupt-Zwibel in der Erde, welche öfters drey Wurzeln übereinander hervorbringt, davon eine jede eines starken Zolls breit von der andern, abgesondert ist; und die aus ihren Aesten und Fasern in der Erde ebenfalls, wie der Stengel, junge Zwiebeln absezt, welche aber ganz weiß, ablang und denen am Stengel gar nicht gleich sehen.

1) de l'Oignon principal dans la terre, qui souvent produit trois racines l'une sur l'autre, dont chacune de ces racines est separée de l'autre d'un bon pouce; qui de leurs branches & fibres dans la terre poussent également comme la Tige de jeunes Oignons, qui sont tout blancs, oblongs, & ressémblent en rien à ceux, qui sont à la Tige.

2) Aus der jungen Zwiebel-Brut am Stengel, zwischen den Blättern und

2) Du Peuple à la Tige entre les feuilles, &

3) Aus dem Saamen S. T. V. von welchen allen an seinem Ort das mehrere nachgebracht werden solle.

3) De la Semence ou Graine, S. T. V. je parlerai plus amplement de tout cela en son tems & lieu.

Ehe ich diese Erklärung schliese, habe ich noch ein Wort vom Antherenstaub mit anzumerken. Man findet nicht leicht eine Blume, welche denselben so groß und deutlich zu erkennen gibt, als diese Feuer-Lilie.

En finissant cette Table, je n'ai que deux mots à dire de la Poudre de l'Anthera. On ne peut pas trouver une fleur, qui fasse si distinctement voir la Poudre des fleurs, que ce Lis doré.

Er färbet nicht alleine das Wasser roth, sondern auch die weizenförmigen Körner werden sehr geschwind zu runden Kugeln, platzen entzwey, und geben ihre Befruchtungs-Theilgen in groser Menge von sich, welche, weil sie der Eigenschaft des Oels oder Honigs gleich sehen, allerley Gestalten und ungleiche Figuren, und darunter auch solche bilden und vorstellen, welche Keimgen oder kleinen Flammen ähnlich sehen.

Elle change non seulement l'eau, en la teignant rouge; mais aussi les Graines, en forme de Blé, deviennent videment rondes, se crevent, & rendent une quantité de particules huileuses, qui prennent toutes sortes de figures, dont il y en a, qui ont la forme des Germes, sont pointuës, & se presentent comme de petits Germes ou Flammèches.

Diese Figuren können nun gar leicht den Herrn Dr. Hill auf die Meynung gebracht haben, daß die Kugeln des Antherenstaubs, mit Keimgen angefüllt seyn sollen.

Ces derniéres formes ou figures ont peut-être porté Mr. le Docteur Hill à croire, que c'étoient de petits Germes.

Allein wer sich nur die Mühe geben will, diesen Versuch ebenfalls anzustellen, wird gar bald erkennen, daß dieses nichts wenigers als Keimgen, sondern öhligte Theilgen sind, dergleichen man täglich sehen kan, wann man auf ein trockenes Glas einen Tropfen Oehl giesset, und derselbe sich gleich dem Queckſilber auf der Fläche des Glases ausbreitet und zertheilet, wie ich es zu seiner Zeit deutlicher zeigen werde.

Mais quiconque veut seulement se donner la peine, d'essayer la même expérience, verra clairement, que ces espéces ne sont rien moins que des Germes, mais au contraire de simples particules huileuses ou mielleuses, qui mettent devant les yeux toutes sortes de figures, lorsque son essence onctueuse & visqueuse se divise sur le verre ou dans l'Eau. On n'a qu'à faire l'essai avec une goutte de l'huile, en la faisant tomber sur un verre trempé dans l'eau, ou en la partageant avec un petit morceau de bois. Je prouverai tout cela dans peu encore davantage.

Ausser diesen fetten Theilgen des Antherenstaubs, sahe ich auch noch, wie schon gedacht, würklich lebendige Wesen, so den Infusions-Thiergen gleich waren, und viel kleiner als die Saamen-Thiergen; (animaux spermatiques) doch zeigten sie eine willkührliche Bewegung nach verschiedenen Richtungen und Wendungen, besonders aber war ihr Gang theils zirkel- theils schraubenmäßig. Man siehet sie fast in allen solchen Observationen zur Zeit des Frühling am gewissesten, und kommen vermuthlich aus der Luft auf den Blumenstaub. Es wird aber nunmehro der Raum erfordern die Erklärung

Outre ces particules huileuses de la Poudre de l'Anthera, j'ai vû de fort petites Créatures vivantes melées entre la liqueur fructifiante des Anthêres, se mouvoir vitement dans l'eau. Elles sont apparement tombées de l'air sur cette Poudre de l'Anthera, comme les Animaux d'Infusion. Elles étoient encore beaucoup plus petites que les animaux spermatiques, & se rémuoient arbitrairement de différentes manières. On voit ces petites créatures ordinairement au Printems, quand on examine les Plantes & principalement la poudre des Fleurs dans l'eau.

der IV. Tafel

vor die Hand zu nehmen.

Il est tems de penser à l'explication de la

IVeme TABLE.

TABULA IV.

Die Birnblüte mit etwas wenigen Holz des Birnbaums, in einem stark vergrösserten Perpendikularschnitt vorgestellt.

Da ich von drey verschiedenen Birnbäumen, so sämmtlich unter die Zwerg-Arten gehören, kleine Aestgen abgenommen, so habe ich sie auch nach ihrer natürlichen Gröſse und Gestalt, insgesammt abgebildet, davon

Figur 1. einen Zweig mit noch jungen Blättern und geschlossenen Blutknöpfgen,

Fig. 2. aber mit offenen Blüten, vorstellet, deren beederseitige Blätter einerley Gestalt hatten.

Fig. 3. Hingegen, stellet einen Zweig vor, mit mehr spitzigern und nicht so breiten Blättern, dessen Stamm auch ganz andere Früchte trägt, so zum Theil in der Herbst-Sammlung, mit erscheinen sollen.

Fig.

TABLE IV.

La Fleur du Poirier représentée avec une tres petite Rogneure perpendiculaire de son bois fort grossie.

Comme j'ai pris de petites branches de trois differents Poiriers, qui appartiennent tous dans la Classe des arbres nains, c'est par cette raison, que je les ai dessiné tous selon leur grandeur & figure naturelle, dont

La Fig. 1. montre une Branche avec des jeunes feuilles & boutons à fleur fermés, mais

La Fig. 2. à fleurs ouvertes, les feuilles de laquelle ont de deux côtés la même figure.

La Fig. 3. au contraire, représente une Branche, dont les feuilles sont plus pointuës que larges, & dont la Tige porte tout autres fruits, comme je ferai voir dans la Récolte de l'Automne.

Fig.

Fig. 4. Bezeichnet ein junges grünes Blat, vom Zweig 1. von deſſen obern, innern, oder glatten Seite anzuſehen, und

Fig. 5. Eben daſſelbe von ſeiner untern oder äuſſern Laage betrachtet, da es mit einer weiſſen Wolle, gleich mit einem ſehr feinen Belz, bedeckt zu ſeyn ſcheinet. Endlich gibt

Fig. 6. Die etwas mehr ſpitzigen Blätter des Zweigs Fig. 3. beſonders abgezeichnet, zu erkennen, von deſſen ſchönen roth und gelb geſprengten Frucht, eine Abbildung in folgender Herbſt-Sammlung g. G. erſcheinen ſoll.

Gewiß: wann die überreiche und wunderbare Allmacht und Weißheit unſers Schöpffers, ſich irgend in Seinen Werken mannigfaltig erwieſen hat, ſo iſt ſie vor allen in dem Reiche der Pflanzen, in ſtiller Ehrfurcht zu entdecken.

Ich will nicht alleine die Früchte ſelbſt darunter verſtehen, obſchon ihre vielerley Arten, denen Menſchen und Thieren zur Nahrung ſowohl als zur Erfriſchung und Labung, dienen müſſen, folglich aller Betrachtung werth ſind; wie auch die Blumen und Blühten, als welche nicht weniger eine groſe Menge eigener Geſchlechter und Arten, unter ſich bewundern laſſen, die ebenfalls vernünftig und unvernünftigen Creaturen zum Beſten und zum Vergnügen, theils für das Aug, theils aber auch für den Geruch (*) und Geſchmack, ihre Beſtimmung erhalten haben, und uns zu einer genauen Betrachtung und Unterſuchung auffordern: Sondern mein Augenmerk ſoll dermalen nur alleine auf jene unbeſchreibliche Menge Blühten oder Blumen gerichtet ſeyn, welche man öfters, auch auf denen gemeinſten Obſtbäumen, an Fuhrweegen und an öffentlichen Landſtraſſen, nicht ohne reitzendes Entzücken, auf Reiſen, im fahren, reuten und gehen, beſonders an Birnbäumen, gewahr wird.

Ich laſſe tauſend und tauſend andere Menſchen, bey einem ſolchen blühenden Baum, vorüber gehen, welche denſelben keiner weitern Ehre würdigen als daß ſie vielleicht bey ſich denken oder ausruffen werden: O! welch ein ſchöner Baum! Sieht er doch als wenn er mit Schnee bedeckt wäre!

Ich meines Orts finde ungleich mehrere Gegenſtände an demſelben, die mich zu einen ſtillen Nachdenken reitzen. Iſt es mir erlaubt? ſo will ich ſolche kürzlich allhier mit anführen.

Dieſer dicke Stamm, war erſt ein kleiner Saamen, von denen ſchwarzen herzförmigen Punkten oder Kernen, deren gemeiniglich 5. oder 6. in einer reifen Birne, enthaltend ſind.

Aus dem in dem Kern verwahrten noch viel kleinern Keim, entſtund das Pflänzgen, hier an dieſem Platz, in der Erde; dieſes enthielte ſchon im kleinen alles, was ich hier vor mir ſo groß ſehe, und ſich endlich zu dieſen ganzen Baum nach und nach entwickelte und ausbreitete.

Soll dieſe Laſt ſicher ſtehen und denen Winden Troz biethen können, ſo muß ein Grund vorhanden ſeyn, welcher dieſes prächtige Gebäude aufrecht hält.

Dieſen

(*) Ich kan nicht umhin hiebey noch mit anzumerken, daß beſonders die Apfelblühte, und einige eigene Geſchlechte derſelben, einen ſehr angenehm und faſt Roſenähnlichen Geruch ſpühren laſſen.

La fig. 4. Deſigne une jeune feuille verde de la Branche 1. en la régardant de ſa face ſupérieure, intérieure ou Unie, &

La fig. 5. La même, obſervée du côté inférieur ou extérieur, où elle paroît être couverte d'une laine blanche comme, d'une fourrure très fine, enfin

La fig. 6. Fait voir les feuilles un peu plus pointuës de la Branche fig. 3. ſéparément deſſinées, le fruit de laquelle eſt d'un beau rouge & parſemé du jaune, & paroîtra dans la Recolte de l'Automne.

Si la Toutpuiſſance & la ſageſſe du Createur s'eſt manifeſtée quelque part de differentes maniéres, c'eſt ſurement dans le Regne des Plantes où elle nous excite à l'adorer.

Je ne comprendrai pas ſeulement là-deſſous les fruits mêmes, quoique leurs differentes eſpèces doivent ſervir aux hommes & bêtes tant pour les nourrir que pour les rafraichir & fortifier, & par conſequant meritent quelques reflexions; encore moins parlerai-je des fleurs, qui nous préſentent à admirer une ſi prodigieuſe quantité de Sexes & Eſpèces, qui ſont deſtinées au bien & plaiſir tant pour les yeux que pour l'odorat (*) & le goût, & nous inyitent à les examiner de plus près; mais je fixerai actuellement mon attention au grand nombre des fleurs que l'on voit ſouvent, même ſur les arbres fruitiers les plus communs, qui ſont plantés le long des grands chemins & routes, que l'on ne ſauroit régarder en ſe promenant ſans plaiſir, & ſurtout ſur les Poiriers.

Je ferai paſſer mille & mille autres perſonnes auprés d'un tel arbre fleuriſſant, qui ne le daigneront d'autre honneur, ſi non qu'ils s'écrieront, voici un bel arbre! a-t-il donc la mine, comme s'il étoit couvert de neige!

Pour moi j'y trouve beaucoup plus d'objets, qui m'appellent de réflechir là-deſſus. S'il m'eſt permis, je rapporterai mes réflexions & penſées en peu de mots ici.

Ce Tronc epais, fut prémiérement un petit grain de ces points noirs ou pepins en forme de coeur, deſquels chaque Poire contient ordinairement 5. à 6.

De ce fort petit Germe gardé dans le Pepin, naiſſoit la Plante ici, en cet endroit, dans la terre; celle-ci renfermoit déja en miniature tout ce que je vois ſi fort aggrandi, & qui s'eſt à la fin petit à petit développé à cet arbre.

Pour que cet arbre ſoit en ſureté & puiſſe reſiſter aux vents furieux, il faut bien qu'il ait un fond aſſuré, qui puiſſe ſoûtenir ce batiment magnifique.

Je

(*) Je me vois obligé d'obſerver encore ici que la Fleur du Poirier, & quelques Genres d'eux donnent en particulier une Odeur douçe, qui reſſemble aſſés à celle de Roſes.

Dieſen finde ich auch in der Erde, an den Wurzeln, welche aus eben den Theilen beſtehen, woraus der ganze Stamm mit ſeinen Aeſten und Zweigen, zuſammengeſezt iſt, nemlich aus dem Rindenlager, ſo fünfferley Häute oder Decken ausmacht; dem Splint; denen Saft, Luft, und Holzgefäſen; Faſern, und zellenförmigen Gewebe; dem Permont oder Baſthäutgen und dem Mark; nebſt ſeinen eigenen und fremden Säften; worunter auch die Luft begriffen iſt, ſo beſtändig, wie das Blut in thieriſchen Körpern, durch den ganzen Baum, im Kreyßlauf ſich bewegen und ihn gleichſam bey Leben und in friſchen Zuſtand erhalten müſſen.

Je le trouve auſſi réellement dans la terre aux Racines, qui ſont compoſées des mêmes parties que toute la Tige avec ſes Branches & Rameaux, ſavoir de la Couche de l'Ecorce, qui forme des peaux de cinq ſortes; de l'Aubier des Vaſes qui procurent le ſuc nourricier, l'Air, & qui forment le Bois; des Fibres & du Tiſſu en forme de cellules; de la Peau de parchemin; & de la Moëlle; de ſes propres Sucs nourriciers, & de ceux qui lui reviennent ailleurs; y compris l'Air, qui circule continuellement, comme le ſang dans les Corps animaux, dans l'arbre, qui lui donne quaſi la vie & le ſoûtient.

Sehe ich von der Erde und dem Stamm in die Höhe, ſo bewundere ich erſtlich die unzähliche Menge derer grünen Blätter, womit ſeine Aeſte, ſeine Krone, ausgeſchmückt iſt, und die gewiß nicht ohne Nutzen, vorhanden ſind. Wie viele Weißheit finde ich nicht an einem einigen Blat! wann ich ſein Ober- und Unterhäutgen, und die Nezförmigen Adern oder das Gerippe deſſelben, anſehe! und dieſer Kunſtſtücke ſind doch ſo viele tauſend allhier zu finden! Ich denke weiters ihrer Beſtimmung nach; und indeme ich im Herbſt, öfters zwey Birn oder andere Obſtbäume, neben einander ſtehend, gefunden, davon der eine ſo zuvor viele hundert Früchte getragen, alle ſeine Blätter verlohren hatte, der andere aber, der faſt gänzlich ohne Früchte geblieben, noch biß im ſtrengſten Winter dick belaubt geweſen, ſo kan ich nicht unwahrſcheinlich muthmaſſen, ja wohl gar für bekannt annehmen, daß die Blätter zum Wachsthum der Früchte, ſehr vieles beytragen, und daher, wann ſie alle ihre Säfte den Früchten mitgetheilt haben, viel geſchwinder abfallen müſſen, als auf Bäumen, welche keine Früchte trugen, als wo ſelbſt die Blätter ihren Saft behalten können.

Si je tourne mes yeux de la Terre & de la Tige en haut, j'admire prémièrement la prodigieuſe quantité des feuilles verdes, dont ſes Branches & ſa Couronne ſont ornées, & qui n'exiſtent ſûrement pas ſans raiſon. Combien de ſageſſe ne trouve-je pas dans une ſeule feuille, quand je conſidére ſa Pellicule ſupérieure & inférieure, & ſes veines en forme de panneau, ou ſon ſquelette, & j'y vois pourtant mille & mille chefs d'oeuvre de cette eſpèce. Je ſonge plus à leur Deſtination, & lorsque j'ai rencontré ſouvent deux Poiriers ou autres arbres fruitiers dans l'Automne enſemble, dont l'un, qui portoit auparavant mille fruits, avoit perdu toutes ſes feuilles, mais l'autre, qui a reſté preſque ſans fruits, avoit gardé ſon feuillage juſqu'au coeur de l'hivèr, je ne ſaurois que préſumer & même approuver que les feuilles aident beaucoup à la Végétation des Fruits, & qu'elles doivent tomber plus promptement, ſi elles ont donné tous leurs ſucs ou ſubſtances aux fruits, que ſi elles ſe trouvent aux arbres, qui ne portoient point de fruits, où alors les feuilles peuvent garder leur ſuc.

Nun gerathe ich von ſelbſten auf den weiſſen Silberſchmelz der Blühten. Denn indem ich zu fragen bemüßiget werde: wo denn nun wohl diejenigen Früchte enthalten ſind, denen die Blätter dienen, und die den Herbſt ſchmücken ſollen? ſo antworten mir gleichſam dieſe kleinen Blumen: Wir ſind es, die holden Väter und Mütter, derer reitzenden Kinder des niedlichen Herbſtes, welche deiner Betrachtung deiner genaueſten Unterſuchung, vor allen andern Geſchöpffen, nicht unwürdig ſeyn werden!

Maintenant je tombe ſur l'email des Fleurs. Car lorsque je me vois obligé à demander, où eſt ce donc que les fruits ſont contenus, auxquels les feuilles ſervent, & qui doivent orner l'Automne? ces petites fleurs me répondent quaſi: nous voici, qui ſommes les Peres & Meres de ces charmants enfants de l'Automne, qui meriterons bien tes réflexions & ton attention de toutes les autres Créatures.

GOtt! wie viel bewundernswürdiges hat nicht ſchon eine einige ſolche Blume in ſich! Der Eyerſtock oder das Germen mit ſeinem Kelch; die Corolle oder weiſſen Blumenblätter, (petala) die Griffels und ihre Narben; die Antheren mit der Menge ihres Blumenſtaubs; ein jedes von allen dieſen, erfordert eine eigene Unterſuchung und Bewunderung! Und wer kan nur alleine den Blumenſtaub genugſam beſchreiben, wann man ſowohl ſeine Menge als ſeinen feinen Bau und ſeine vortrefliche Beſchaffenheit und geheime Beſtimmung, zu Tage legen will?

Mon Dieu! combien de choſes dignes d'être admires ne poſſede pas une telle unique fleur. L'Ovaire ou le Germen avec ſa Coupe, le Corail ou les Pétales, l'Aiguille & ſes Nervures, les Anthêres avec la grande quantité de leur Poudre; chaque particule de toutes ces choſes demande & mérite ſeule une étude particuliére. Et qui eſt ce qui ſauroit ſuffiſament décrire ſeulement la Poudre Antherique, ſi on conſidére ſa quantité, ſa ſtructure merveilleuſe, ſes qualités extraordinaires & ſa Déſtination ſécréte?

Welch eine tiefe Weißheit des Höchſten, erkennet man nur in einer einigen ſolchen Blume! und es ſind derſelben doch zu vielen hunderten, öfters auf einem einigen Baum! Wie viele hundert gehen davon verlohren, welche der Wind

Quelle Sageſſe immenſe du Toutpuiſſant ne reconnôit donc pas dans une telle ſeule Fleur; & vous en voyès une Miliaſſe ſur un ſeul arbre! Combien de fleurs périſſent, que le Vent & la Pluye

Wind und Regen samt den jungen Embryonen abwirft! Was verderben die Vögel, Rauppen und andere Insecten! und was fällt sonst aus andern Ursachen ab!

Pluye font tomber avec les jeunes Embrions! Que ne ruinent pas les Oiseaux, les Chenilles & les autres Insectes, & que ne tombe pas par des raisons sécrétes.

Hier unterstehet sich öfters der menschliche Wiz und Verstand, seine verwegenen Fragen dem Schöpfer, gleichsam vorzulegen und die ewige Haußhaltung des Höchsten, zu meistern.

C'est cependant ici, où l'esprit troublé & hardi des Mortels ose souvent quasi questioner le Createur, & maîtriser la Sageſſe, la Disposition & Economie du Maître de l'Univers.

Er siehet den Reichthum der Güte GOttes, für einen Ueberfluß an, der sich doch auch so offenbahr in dem Thierreich, besonders in den Eyerstöcken der Fische und Vögel, ergiebet. Speisen wir nicht zuweilen bey einer Mahlzeit, mit dem Rogen etlicher Fische, mehr, als aus manchem grossen Teich gefischt werden?

Il croit les richesses de la Bonté du Seigneur superflues qui s'est pourtant tant manifestée dans le Regne Animal & surtout dans les Ovaires des Poissons & Oiseaux. Ne mangeons-nous pas quelque fois dans un seul répas moyennant les Oeufs plus de poissons, qu'on ne sauroit prendre dans le plus vaste Etang?

Ich habe in der Rechtfertigung und Vertheidigung meines Sendschreibens, von dem würklichen Daseyn derer lebendigen Saamenthierchen, ein und das andere davon, mit angeführt; ich will aber meinen g. L. anstatt Sie auf diese Abhandlung zu verweisen, lieber die schöne Abfertigung des aufrichtigen Herrn Abt Pluche zu überlesen anempfehlen, womit derselbe alle diese vorwitzigen Fragen, beantwortet hat, (*) und meines Orts glauben, daß man mehr Ursache habe, die reiche Hand des Schöpffers, in tiefster Ehrfurcht, für so vielen Ueberfluß zu preisen, als seine ewige Einrichtung frevelhaft zu meistern.

J'en ai déja suffisament parlé dans l'Apologie de ma Lettre de l'Existence des Animaux Spermatiques vivants; mais, au lieu de renvoyer mes Lecteurs à mes propres pensées, j'aime mieux leur recommander à lire la belle Réponse du droit & sincére Monsieur l'Abbé *Pluche* (*) dans laquelle il a assés répondu à toutes ces questions hardies; & j'aime mieux croire de mon côté, que l'on ait plus de raisons de rendre graces à la main bienfaisante du Créateur de tant de Bontés, qu'à maîtriser témérairement son Economie.

Weil ich mir nun aber auch einen mehr vollkommnern Begriff von dem Bau und den Theilen der Birnblüthe machen wollte, so nahm ich endlich meine Vergrösserungs-Werkzeuge zur Hand, und beobachtete damit die

Mais comme j'ai voulu me procurer une idée plus compléte de la structure & des Parties de la Fleur du Poirier, j'ai pris à la fin mes Instruments Microscopiques & j'en ai observé

Fig. 7. abgebildete einzelne Blume, welche ich von dem Zweig Figur 2. zur Untersuchung abgenommen hatte.

La Fleur représentée fig. 7. que j'ai pris de la Branche fig. 2. pour l'examiner de plus près.

Ich stelle sie mit der

Je la représente encore.

Fig. 8. auch noch von aussen vor, um das Germen sehend zu machen, an welchem der grüne Kelch zugleich vom Stiel aus, fortläuft.

Fig. 8. Du déhors, pour faire voir le Germen, auquel la Coupe verde tient dès la Queve.

In dem Kelch stehen, um den Rand des Germens, die fünf weissen Petala oder Blätter der Korolle, welche von denen spitzigen fünf Theilen des grünen Kelchs so lange zusammen gehalten werden, biß die Befruchtung geschehen ist; dann fallen diese weissen Blätter ab. Nach ihnen folgen ebenfalls auf dem innern Boden oder Rand des Germens, die 22. Antheren oder Staubträger; Fig. 9. welche anfänglich, wann sich die Blühten öfnen, Rubinrothe Staubsäckgen haben, die sich aber hernach Fig. 10. Citronen oder Goldgelb zeigen, wann sie einige Tage älter werden, welches der alsdenn herausgedrungene Antherenstaub, verursachet.

Les cinq Pétales blancs ou Feuilles du Corail sont plantés dans la Coupe autour du bord du Germen, que les cinq Particules pointuës de la Coupe verde serrent tant, jusqu'a ce que la Fructification ou Fertilisation se soit faite, où alors ces Feuilles blanches tombent. Après les Pétales viennent les 20, ou 22. Anthêres sur le Fond ou Bord du Germen fig. 9. qui ont au commencement, quand les Fleurs s'ouvrent, des Bourses de la Poudre Antherique couleur de Rubis, mais qui se montrent après couleur de Citron ou d'or fig. 10. quand ils ont passé quelques jours, c'est ce que cause la Poudre Antherique, qui a pénétré alors.

Daher kommt es auch vielleicht, daß einige ältere Schriftstellere und Naturkundige, diese Antheren als bund oder mit zweyerley Farben getüpffelt, angegeben haben, weil sie nicht bemerkten, daß der Antherenstaub diese Farben-Veränderung oder gedoppelte Farbe, verursachet.

C'est peut être aussi par cette raison que quelques anciens Ecrivains & Physiciens ont dépeint les Anthêres mélangés ou marquetés de deux Couleurs, parce qu'ils n'ont pas rémarqué que la Poudre Antherique avoit causé ce Changement ou Mélange de Couleurs.

Wann

Mais

(*) Historie des Himmels, aus dem Französischen des Herrn Abt Pluche, 2ter Theil, Dresden und Leipz. 1740. von Seite 225. biß 256. u. a. m.

(*) Dans l'Histoire du Ciel, traduite du François à Dresde & Leipsic 1740. Tome II. depuis la Page 225. jusqu'à la Page 256.

Wann aber die Staubbeutelgen noch ganz jung sind, sehen sie olivenfarb, werden hernach roth, endlich purpur und zulezt schwarzbraun. Die gelbe Farbe ist gar kein Eigenthum ihres Weesens, sondern eines dazu gekommenen fremden Körpers, nehmlich, wie schon gedacht, des Antherenstaubs.

Mais quand ces Bourses de Poudre sont encore jeunes, alors elles sont Couleur d'Olive, deviennent peu aprés rouges, couleur de Pourpre & bay brunes. Le jaune ne leur est pas substantiel, mais il est l'effet d'un autre Corps étranger, c'est à dire, de la Poudre Antherique.

Fig. 11. Zeigt einen solchen Staubträger durch die Linse Nro. 6. vergrössert, wann er noch geschlossen ist, und

La fig. 11. Représente un tel Anthêre grossi par la Lentille Num. 6. quand il est encore fermé, &

Fig. 12. wann er sich geöffnet hat und nunmehr mit Staub bedeckt ist, da er einem Kirchenpulte ähnlich kommt, auf dessen beeden Seiten ein aufgeschlagenes Buch lieget; man siehet zugleich den gelben Befruchtungsstaub, häufig, auf seinen nun offenen Blättern liegen.

La fig. 12. quand il s'est ouvert & est couvert de la Poudre, où il a la Mine d'un Pupître, sur les deux Côtés duquel se trouve un Livre ouvert; on voit en même temps la Poudre fructifiante jaune, couchée en grande quantité sur ses Feuilles actuellement ouvertes.

Und da auch die Blühten der Birnen unter die Zwitterarten gehören, so findet man nicht alleine die biß daher beschriebene Stamina oder Antheren, als die männlichen, sondern auch die Pistille als die weiblichen Befruchtungstheile, gar deutlich in denenselben. Es sind deren in jeder Blume wie erst gedacht worden, fünfe und stehen zwischen denen 20. biß 22. Staubträgern, in der Mitte des Germens, auf dem Eyerstock. Einer davon ist

Et comme les Fleurs du Poirier appartiennent dans la Classe des Espèces Hermaphrodites, on y voit trés distinctement non seulement les Parties Genitales Mâles, c'est à dire, les Etamines ou Anthêres; mais aussi les Parties Genitales Femelles, savoir les Pistiles. Il y en a cinq dans chaque Fleur, & ils se tiennent entre les 22. Anthêres au Centre du Germen sur l'Ovaire. J'en ai représenté un par

Fig. 13. hier, nur durch das Suchglaß, mit der Narbe dem Wärzgen oder Stigma, (a) und dem Griffel (b) durch

La fig. 13. observé seulement par la Lunette, avec la Verruê ou le Stigme (a) & l'Aiguille (b), par

Fig. 14. hingegen etwas mehr vergrössert, vorgestellet.

La fig. 14. au contraire un peu plus grossi.

Man sollte fast glauben, daß weil die Birne fünf Saamenfächer hat, so möchten vielleicht eben so viele Griffels für dieselbe, von dem Schöpffer bestimmt worden seyn; alleine da die Erfahrung eine grosse Ausnahme bey dieser Regel macht, so kan man ohnmöglich diese Muthmassungen für eine bekannte allgemeine Warheit, annehmen.

On sauroit croire que, puisque la Poire a cinq Capsules de Semence, le Créateur lui avoit destiné autant d'Aiguilles; mais comme l'Experience contredit à cette Regle, l'on ne peut pas approuver cette conjecture.

Ich habe verschiedene junge Birnen gefunden, welche fünf Fruchtfächer und nur vier Griffel in der Blume hatten.

J'ai rencontré de jeunes Poires, qui avoient cinq Cassetins ou Cellules de Semence, & seulement quatre Aiguilles dans la Fleur.

Andere zeigten mir nur vier Saamenfächer, und fünf Griffels.

D'autres me présentoient quatre Cassetins de Semence & cinq Aiguilles.

In denen Saamen-Capseln selbst, waren auch die Embryonen sehr ungleich. In manchem Fach, reifer Birnen, sah ich nur einen Kern, in dem andern zwey, in dem dritten gar keinen, in dem vierten drey, und in dem fünften Fach wiederum zwey oder auch nur einen, und viele andere Birnen, hatten in jedem der fünf Fächer, durchgehends zwey Saamenkerne.

Les Embrions étoient fort inegaux même dans les Capsules de Semence. Je voyois dans quelques Cellules ou Cassetins des Poires mûres seulement un Pepin, dans la deuxiéme Cellule deux, la trosième n'en avoit point, la quatriéme trois, la cinquiéme deux ou seulement un, & plusieures autres Poires avoient dans chaque de ces cinq Cassetins généralement deux Pepins.

Indessen ist nichts gewissers, als daß man von einem jedem Griffel einen eigenen Haupt-Canal auf ein solches Fach herunter lauffen siehet, wo er sich wieder zu unterst in zwey Theile oder Röhren spaltet, davon eine jede Röhre, sich mit einem Embryo oder Saamenkern, dergestalt verbindet, daß das Ende eines solchen zarten Röhrgens des Griffels, und die Spitze des Keims in dem Saamenkern, gleichsam, wie die Nabelschnur mit dem Thier, zusammenhänget. Welches ich zu seiner Zeit so wohl in der Herbst-Sammlung als auch bey der Bildung der Kerne oder Saamen, noch mehrers durch Figuren g. G. erläutern werde.

Il est pourtant constaté que l'on voit descendre un Canal ou Conduit Principal de chaque de ces Aiguilles sur une telle Cellule, où il se divise tout au bout en deux Parties ou Tuyaux, dont chaque Tuyau se lie tellement avec un de ces Embrions ou Pepins que le Bout d'un tel tendre Tuyau de l'Aiguille, & la Barbe du Germe dans le Pepin s'entretiennent quasi comme le Cordon de l'Animal. J'expliquerai tout cela encore d'avantage par des Figures tant dans la Recolte de l'Automne qu'en montrant la Formation des Pepins ou de la Semence.

Auf dieſe Weiſe ſind alſo die Griffel, ſehr nöthige Theile zur Fortpflanzung dieſer Art Bäume; und glaube ich gewiß, daß, wann nur eine einige ſolche Faſer oder zarte Röhre, in dem Griffel, verlezt, verkrümmt, oder beſchädiget wird, welche beſtimmt iſt die Embryonen zu ihrer Vollkommenheit zu bringen, daß auch, (wie man in vielen Früchten täglich ſehen kan) die Kerne taub, unvollkommen, und unbefruchtet bleiben; und daß manches Fach in den Birnen und Aepfeln ꝛc. gar keinen Kern, manches aber nur ſchwarze, leere, vertrocknete, runzliche Hülſen, ſtatt der Saamen zeige ꝛc.

Der Antheren oder Blumenſtaub, der nun zur Befruchtung dieſer Embryonen in dem Ovario beſtimmt iſt, erſcheinet hier

Fig. 15. Gerſtenförmig, wann er betrachtet wird wie er auf denen Staubſäckgen liegt. Er wird aber wie

Fig. 16. zeigt, ebenfalls rund, wie der meinſte Blumenſtaub, wann man ihn in einem Tropffen Waſſer durch No. 1. beobachtet, wo er ſein öhlichtes Weeſen auch reichlich auswirfet.

Fig. 17. Iſt ein Germen oder Eyerſtock, woraus die kleine Birne c ſich bildet, mit denen noch darauf befindlichen fünf Griffeln, in natürlicher Gröſſe, ingleichen

Fig. 18. eben daſſelbe ohne Griffels, um den fünffach ausgezackten Kelch, zu zeigen; und

Fige 19. 20. zwey andere ohne Kelch, jedoch mit denen 5. Griffeln und dem Früchtgen c. Weil ich nun bey der 13. und 14. Figur, einige Worte von der Beſtimmung der Griffel angebracht, ſo wollte ich durch

Fig. 21. und 22. ein ſolch Früchtgen vorſtellen, wie es geöfnet anzuſehen iſt; welches

Fig. 23. deutlicher zeiget, indeme ich es durch das Suchzglas, abgezeichnet habe. Worbey zu erſehen ſeyn wird, wie ein jeder Griffel auf ein Saamenfach herunter lauft, und zur Befruchtung derer in denen Fächern befindlichen Embryonen, ſeine Dienſte verrichtet. Dieſe zarten weiſſen Eyer, aus denen hernach die ſchwarzen Kerne in der Mitte der Birne werden, entdecket man ſchon mit einem guten Vergröſſerungs-Glas, wann auch das an dem Blüthknöpfgen befindliche Birnfrüchtgen c. nicht gröſſer als ein Stecknadel-Knöpfgen, ja noch kleiner iſt; und dieſe erlangen, wie ſchon gedacht, ihre Reife und Vollkommenheit, aus denen Röhrgen der Griffel, als welche ihnen den auf der Narbe des Wärzgen oder Stigma zerflieſſenden Antheren oder Befruchtungsſaft, zu leiten.

Die übrigen Theile aber der Birn, als die Haut, das Fleiſch und die Steine derſelben, wachſen durch die Saft-Röhrchen der Stiele. Wiewohl ich mich gerne eines beſſern wollte belehren laſſen, daferne ich deſſen überzeugt werden könnte.

Fig. 24. Bemerkt daher den Durchſchnitt eines ſolchen Griffels, deſſen innerſter Gehalt, aus einer Menge der feinſten Haarröhrchen beſtehet, welche insgeſamt, theils mit denen Saamenfächern, theils mit denen Embryonen

Nous voyons donc par cette raiſon que les Aiguilles ſont des Parties fort néceſſaires à la Végétation de cette Eſpèce d'Arbres, & je crois poſitivement que les Pepins demeurent engourdis, imparfaits & ſtériles, ſi l'on bleſſe, courte ou endommage ſeulement une de ces Fibres ou tendres Canaux de l'Aiguille, qui eſt deſtinée à porter les Embrions à leur Perfection, (ce que l'Expérience nous prouve tous les jours) & qu'il y a des Caſſetins dans les Poires & Pommes, dont les uns ne produiſent qu'un ſeul Pepin, & les autres n'engendrent que des Gouſſes noires, vuides, deſſéchées & cotoneuſes au lieu de Grains.

La Poudre Antherique, qui eſt deſtinée à rendre les Embrions fertiles dans l'ovaire paroit ici

Fig. 15. en forme d'Orge, quand on l'obſerve comme elle eſt couchée ſur les Bourſes de Poudre. Mais elle devient, comme

La Fig. 16. montre, auſſi bien ronde que la plûpart de la Poudre des Fleurs, quand on la régarde par la Lentille Num. 1. dans une goutte d'eau, où elle jette abondament ſa Subſtance huileuſe.

La Fig. 17. Eſt un Germen ou Ovaire, duquel naît la petite Poire, avec les cinq Aiguilles, qui ſe trouvent encore là-deſſus, dans la grandeur naturelle, &

Fig. 18. le même ſans Aiguilles, pour faire voir la Coupe dentelée de cinq manières, &

Fig. 19. 20. deux autres ſans Coupe, mais cependant avec les cinq Aiguilles & le Fruit (c). Et comme j'ai dit quelque choſe à l'occaſion de la 13ème. & 14ème. Figure de la Déſtination des Aiguilles, je voulus auſſi repréſenter

par les figures 21. & 22. un tel fruit, comme il ſe préſente, étant ouvert, ce que

La fig. 23. montre encore plus diſtinctement, puiſque je l'ai deſſiné par le moyen de la Lentille. On y verra, comment chaque de ces Aiguilles deſcende ſur une Capſule de Semence, & ſert à faire fertiliſer les Embrions, qui ſe trouvent dans les Caſſetins ou Cellules. On decouvre déja ces Oeufs tendres & blancs, deſquels après les Pepins noirs naîſſent dans le milieu de la Poire, moyennant un bon Microſcope, quand même le petit Fruit (c) qui ſe trouve aux Bourgeons, ne ſoit pas plus grand, même encore plus petit que la tête d'une épingle; & ces Oeufs obtiennent leur maturité & perfection, comme j'ai dit ci-deſſus, des tuyaux des Aiguilles, qui leur amenent le Suc d'Anthères, qui ſe fonde ſur la Cicátrice de la Verrüe ou Stigme.

Les autres Parties de la Poire comme la Peau, la Chaire & les Pierres, croiſſent, moyennant les Tuyaux qui procurent les Eaux au Queues. Je veux pourtant bien écouter les raiſons des autres, pourvû qu'ils puiſſent m'en convaincre par des raiſons ſolides. C'eſt par cette raiſon que

La Fig. 24. obſerve le Diamétre d'une telle Aiguille, la Subſtance intérieure de laquelle conſiſte en un tas de Chevelures de plus fines, qui toutes enſemble correſpondent en partie aux Capſules de

Semen-

nen, zusammenhangen. Ich habe denselben nur durch Nr. 5. betrachtet und abgezeichnet.

Allein der vorgeschriebene Raum nöthiget mich, das übrige, biß zu denen andern Vorstellungen, zu verspahren, und nunmehr die noch schuldige Beschreibung des auf der ersten Kupfertafel abgebildeten Apfelholzes, nachzubringen.

Damit ich aber diese in Warheit sehr mühsame Arbeit, mit etwas mehrern Nutzen bewerkstelligen möge, so habe ich von dem Birnholz, welches von jenem ohnehin sehr wenig und kaum merklich unterschieden ist, statt eines Zwergschnitts, ein Spähngen etwas mehr schreg als gerad oder perpendikular, von einem zehenjährigen frischen Ast, so fein es mir nur möglich war, abgeschnitten, wie es

Fig. ☾ natürlich und

Fig. ♂ durch die höchste Vergrösserung beobachtet und abgezeichnet, auf dieser IV. Tafel getreulich angebracht worden.

Ich darf gar wohl versichern, daß ich nicht nur einmal sondern gar oft, diejenigen vielen und fleißigen Beobachtungen gelesen, betrachtet und nachgemacht habe, welche von **Leeuwenhoeck, Malpigh, Grew,** und andern Naturforschern, der Welt in öffentlichen Schriften, bekannt gemacht worden sind.

Ich kan aber auch bekennen, daß ich biß diese Stunde, von der Richtigkeit ihrer Figuren und Abbildungen, noch keine vollkommene Ueberzeugung, ohngeachtet aller meiner Bemühungen, von denen angeblichen Bestandtheilen derer verschiedenen Holzarten, erlangen können.

Man mag von denen Saft- Luft- und Holzgefäsen sagen und schreiben was man will, so behaupte ich doch jederzeit aus der Erfahrung, daß sich alle diese schöne Benennungen, mit keiner überführenden Gewißheit, bestimmen lassen.

Nimmt ein angehender Naturforscher alle diejenigen Meynungen vor sich, welche von so vielen Gelährten, von dem Bau des Holzes, geäussert worden; so wird er gewiß in eine ungemeine Verwirrung gerathen, wann er selbst das Vergrösserungsglas ergreift, und Hand, zur Untersuchung desselben, anleget.

Ich will dieses mit allen denjenigen Benennungen erweisen, welche denen Theilen des Holzes, biß auf den heutigen Tag, zusammen beygelegt worden sind.

An und in einem Stamm, befinden sich erstlich die Wurzeln und Aeste, dann die Rinde; diese hat wiederum, wie ein Buch, ihre blätterigen Laagen, deren 4. biß 5. sind, und wovon eine jede eine andere Zusammensetzung und Bestimmung hat.

Nach denen Häuten oder Laagen der Rinde, folgt der Splint, ferners das Holz, und in der Mitte das Mark. Alle diese Haupttheile, woraus die Aeste und Wurzeln ebenfalls bestehen, enthalten eine Menge von Gefäßen, nehmlich das zellenförmige Gewebe, die Utrickeln, Blasgen oder Schlingen und Maschen, so von dem nezförmigen Geflechte, gemacht werden; die Luftröhrchen, die Saftröhrchen, die Spiralförmigen Gefäse, die eigenen Gefäse, die Wassergefäse, die Markgefäse.

Andere

Semence, & en partie aux Embrions. Je l'ai observé & designé seulement par la Lentille No. 5.

Les bornes que je me suis donné, me forcent de reserver le Reste jusqu' aux autres Représentations, & m'obligent d'y ajoûter la Déscription promise du Bois du Pommier, que j'ai dessiné à la prémière Table.

Mais pour me faciliter un peu cet Ouvrage très pénible, & pour le rendre plus utile aux Lecteurs, j'ai pris au lieu d'une Coupure oblique une petite Planure ou Eclat un peu plus oblique que droite ou perpendiculaire du Bois du Poirier, qui sans cela ne differt que très peu du Bois du Pommier, & d'une Branche verde de dix ans, que j'ai coupé aussi mince qu'il m'étoit possible, comme je l'ai représenté

par la fig. 25. naturellement, &

par la figure 26. observé & dessiné par le plus fort Microscope à cette IVème. Table.

Je puis hardiment assurer, que j'aie lis, observé & essayê plus d'une fois cette quantité prodigieuse d'Observations soigneuses que les *Leeuwenhoeck*, *Malpigh*, *Greu* & plusieurs autres Physiciens ont fait connoître aux Savans dans leurs Ecrits.

Mais malgrè tous mes efforts, je me vois obligé d'avouer que je n'ai pas encore pû me convaincre iusqu'à ce moment de la justesse de leurs figures & desseins & de pretenduës Parties substantielles de differentes Especes du Bois.

Qu'on dise tout ce qu'on veut de Vases qui sont destinés pour les Eaux, l'Air & Bois, néanmoins j'assurerai toujours par l'Experience que j'en ai, qu'on ne sauroit jamais déterminer tous ces bons Noms avel quelque certitude hors de doute.

Si un Physicien, qui commence à se rendre la Nature plus familière examine toutes les opinions, qu'un nombre infini de Savants a gouté de la structure du Bois; alors il se verra tout embrouillé, lorsqu'il prendra lui même le Microscope & s'apprêtera à examiner la chose même.

Je prouverai tout ce que j'ai dit par les denominations, qu'on donne jusqu'à présent aux Parties du Bois.

Une Tige est composée prémièrement de Racines & Branches & de l'Ecorce. Celle-ci a encore des Couches de plusieures feuilles comme un Livre au nombre de 4. à 5; dont chacune d'elles est autrement composée.

Après les Peaux ou Couches de l'Ecorce, suit l'Aubier, le Bois & au milieu la Moëlle. Toutes ces Parties éssentielles, desquelles les Branches & Racines sont composées de même, contiennent une quantité de Vases, savoir le Tissû de Cellules, les Utricules, les Vésicules ou Lacets & Mailles, que l'entrelassement en forme de filets a fait, les Trachées, les Tuyaux qui donnent le suc nourricier, les Canaux tournés en forme de vis ou de ligne spirale, le Vase propre les Conduits qui procurent les Eaux, & les Vases qui forment la Moëlle.

Parmi

Andere gehen kürzer, und nennen dieſe Gefäſe Fibern und Fibrillen (Fibras & Fibrillas) da ein Büſchel von Fibrillen oder Fäſerlein, faſciculus fibrillarum eine fibram ausmacht.

Dergleichen Fibern hat **Leeuwenhoeck**, Saftgefäſe genennet, und ſie ſo klein befunden, daß er in dem $\frac{1}{80}$. Theil eines Quadrat-Zolls, mehr als 20000. derſelben, gezählt haben will.

Sie theilen ſolche ferners ein in fiſtulas ſucciferas und tracheas, oder in Waſſer und Luftröhrgen, ingleichen in zuführende und ableitende Gefäſe, in die eigenen Holzfaſern, fibras ligneas, Zirkelfaſern, Involucra, und Zubereitungs-Gefäſe, ſo wie der Magen, die Digeſtion des Saftes verrichten (Utriculos).

Ob nun gleich niemand widerſprechen kan, daß in einem jedem Holz ſich dieſe Gefäſe insgeſammt befinden, ſo iſt es doch keine ſo leichte Arbeit, als man vielleicht glaubt, ein jedes derſelben beſonders zu entdecken und zu behaupten, daß dieſe Fiber oder Faſer eine Waſſerröhre, und jene ein Luftgefäſe, dieſe eine zuführende und jene eine ableitende Röhre, oder eine Holzfaſer ſeye.

In einem zirkelrunden Horizontalſchnitt, iſt dieſes gar nicht möglich, ehender aber in einem Spähngen das nach der Länge des Stamms, abgenommen worden iſt.

Die tägliche Erfahrung und der gemeine Gebrauch der Hölzer, überzeugt uns ſchon, daß Saft- Luft- und Holzfibern darinnen ſeyn müſſen.

Bringt man z. B. ein friſches Holz zum Feuer, ſo ſiehet jedermann mit bloſen Augen, wie von der Hitze, die Feuchtigkeit aus denen Waſſergefäſen heraus getrieben wird, weil es dunſtet und rauchet. Die angebohrten Birken und Ahornbäume, auch das Rebenholz ꝛc. bezeugen dieſes ebenfalls, durch ihren Saft, der aber ſehr unterſchieden iſt, und in manchen Bäumen als ein Waſſer, in andern gleich einem Gummi, wieder in andern wie Pech und Harz erfunden wird. Daher leicht zu ſchlieſen iſt, daß auch zu dieſen eigenen Saft, eigene Gefäſe nöthig und vorhanden ſeyn müſſen.

Die Luft wird durch die Kunſt ſowohl als durch die Natur, in dem Holz entdecket. Vermittelſt der Luft-Pumpe können verſchiedene Verſuche damit angeſtellet und ſogar Queckſilber durchgezwungen werden, welches hier anzuführen überflüßig ſeyn würde.

Und **Sturm** hat ſchon zu ſeiner Zeit, ein Hygrometer von Holz zu machen gelehret, um die Witterung der naſſen oder trockenen Luft, damit abmeſſen zu können; anderer nicht zu gedenken (*).

Selbſt dem gemeinen Mann, iſt das krachen, knallen und platzen des Holzes in denen Zimmern und Stuben, an Wänden, Schränken, Tiſchen, Stühlen, das ſchwinden und verquellen der Thüren ꝛc. zumahlen was vom Tannenholz gemacht iſt, ein Anzeigen des naſſen oder trockenen Wetters.

Denn ſo warmes Wetter iſt, ſo trocknet die Luft in ihren Holzgefäſen aus, die Faſern ſchwinden ſodann nach der

Parmi les Phyſiciens il y en a, qui pour abréger, nomment tous ces Vaſes, Fibres ou Fibrilles, où alors un tas de Fibrilles fait une ſeule Fibre.

Leeuwenhoeck a donné à ces Fibres le nom des Vaſes, qui donnent le Suc, & les à trouvé ſi petites, qu'il en a voulû compter juſqu'à vingt mille dans la quatre vingt dizième Partie d'un Pouce de la Quadrature.

D'autres les diviſent en Vaiſſeaux qui donnent les Eaux, & Trachées; en Vaiſſeaux qui amenent le Suc nourricier & le font ſortir, en Fibres du Bois, en Enveloppes & Utricules qui digérent le Suc comme le fait l'Eſtomac dans l'homme.

Quoiqu'on ne puiſſe pas nier que tous ces Vaſes ſe trouvent enſemble dans chaque Bois, il n'eſt pourtant pas ſi aiſé, comme on croit, de découvrir ſéparément chaque de ces Vaiſſeaux, & d'aſſurer que cette Fibre ſoit un Tuyau qui procure les Eaux, & l'autre une Trachée, celle-ci un Canal qui améne le Suc, & l'autre un Tuyau qui le fait ſortir, ou une Chevelure.

Il n'eſt pas poſſible de voir cela dans une Coupûre horizontale, mais plutôt ſi on coupe un éclat du long de la Tige.

L'experience journaliére & l'Uſage ordinaire des Bois nous convainc déja qu'il y ait de toute neceſſité des Fibres, qui contiennent l'Air, le Suc ou des Eaux, & qui forment le Bois.

Si on approche du Bois verd du Feu, on voit de ſes yeux ſans Lunette, comme la Chaleur pouſſe les humidités des Vaſes qui procurent les Eaux, quand le Bois commence à s'evaporer. Les Bouleaux, les Erables & les Sarments qu'on perce, prouvent la même choſe par leur Suc, mais qui varie conſiderablement, & qui dans quelques Arbres reſſemble à de l'Eau, dans les autres à la Gomme, & encore dans les autres au Goudron & à la Glû. Cela nous fait conclurre qu'il faut abſolument, qu'il y ait des Vaſes propres à ce Suc propre.

Tant l'Art que la Nature nous aident à decouvrir l'Air dans les Bois. On eſt en état de faire de differents eſſais par le moyen de la Machine Pneumatique avec les Bois, on y peut même faire paſſer du Vif Argent, que tout le monde ſait déja, & ſeroit par conſequent ſuperflû d'en parler davantage ici.

Déja Mr. *Sturm*, ſans nommer pluſieurs autres, nous a appris de ſon tems à conſtruire un Hygromêtre de Bois, pour être en état de pouvoir méſurer le Changement de l'Air humide ou ſec (*).

L'Homme le plus ſimple regarde le Pétillement & Craquement du Bois dans les Appartements, aux Murailles, Armoires, Chaiſes, Fauteuils & Tables, le Gonflement des Portes, & de tous les Meubles qui ſont faits de ſapins, comme un Préſage ſûr & immanquable du Tems ſec ou humide à venir.

Car s'il fait chaud, alors l'Air ſe déſſeche dans ſes Vaſes du Bois, & les Fibres ſe déjettent en lar-

geur,

(*) Joh. Chro. Sturm in Collegio experiment. curioſ. P. 1. Tent. XIV. pag. 120. 4to. Norimb. 1676.

der Breite, (niemalen nach der Länge) und verursachen daher, daß das Holzwerk eingehet oder schwindet. Bricht aber eine nasse Witternng ein, so werden die Luftgefäse wieder von feuchter Luft angefüllt, sie dehnen die nebenstehenden Fasern in die Breite auseinander, und weil das Holz eingefangen ist, so müssen einige Fasern von der Gewalt der Luft, ausspringen, wodurch dann die Risse im Holz, entstehen, und das krachen erfolget.

Und so kan sich ein jeder überzeugen, ohne ein Vergrösserungs-Glas nöthig zu haben, daß nebst denen Fasern, so das Holz selbst ausmachen, auch Luft- und Saftgefäse in einem jedem Holz seyn müssen. Und daß das krachen der Wände und Schränke ꝛc. in denen Zimmern, keine schlimme Anzeigen oder Ankündigung des Todtes, sondern nur der bevorstehenden Wetter-Veränderung seye.

Will man aber die übrigen Gefäse entdecken, so muß man allerdings nicht nur ein gutes, sondern gewiß das allerbeste Vergrösserungs-Werkzeug, dazu vor die Hand nehmen und gebrauchen.

Vermittelst dessen entdecket man an einem Horizontalschnitt, 1) in der Mitte, das Mark, welches aus unförmlich sechseckigten blasigten Zellen, bestehet; (a) Fig. ⊙. 2) verschiedene zarte, vom Umfang des Marks biß zur Rinde oder der äussersten Peripherie des Holzes auslauffende Fasern, gleich denen Linien an einer Sonnenuhr (b); zwischen denen sich etwas dickere und stärkere befinden (c), sollten nicht die erstern die Holzfasern und die dickern die Ausführungsgefäse seyn? Ich werde diese Muthmassung bey dem Rebenholz wahrscheinlicher zu machen, mich befleißigen. Ich vermuthe es, wegen der vielen Punkten, welche man aussen in dem Umfang der Rinde dieses Holzes findet, und die mit diesen Linien gleiche Richtung haben.

3) Eine Menge kleiner runder Löcher (d), welche aber durch die stärkste Vergrösserung fast sechseckigt, theils eyrund, theils ablang viereckigt, sich zeigen, diese sind nichts anders als die Oefnungen oder Mündungen derer durchschnittenen Perpendikular-Röhrgen, so den ganzen Stamm, nach dessen Höhe von der Wurzel biß zur Krone, gerade durchlauffen

4) zirkelrunde, gleich den Faschinen geflochtene, und rings herum lauffende Kreise, von Fasern oder Fibern, welche **Malpigh**, Involucra nennt, und das Alter des Baums von darum anzeigen (e) weil alle Jahr ein neuer solcher Zirkel, im Holze entstehet. Vermuthlich sind es blose Holzfasern, welche dazu bestimmt seyn mögen, die perpendikularen Holztheilgen, vest zusammen zu halten, und mit einander zu verbinden, um dem Stamm seine Vestigkeit zu verschaffen. Zwischen Ihnen siehet man Mündungen von perpendikular durchlauffenden Gefäsen.

5) Die Lagen der Rinden (f) an welcher man in einem solchen Querschnitt, nichts als das zellenförmige Gewebe der kleinen Blasen oder Utrikeln sehen kan.

Wer ein mehrers an einem solchen kleinen Theilchen Holz, das nach der Dicke und nicht nach der Länge des Stammes

geur, mais jamais en longueur, & causent parlà que le Bois se déjette. Mais si le Tems est humide, alors les Vases de l'Air se rempliſſent de cet Air humide, ils elargiſſent les Fibres voisines, & puisque le Bois se trouve serré, il faut absolument que quelques Fibres se crévent à force de l'Air, c'est ce qui cause le Pétillement & les Crévasses du Bois.

De cette manière tout le monde peut se convaincre, sans avoir besoin d'un Microscope, qu'il faut qu'outre les Fibres du Bois il y ait aussi des Trachées & des Vases, qui donnent le Suc, tans toutes les espèces du Bois. Ainsi le petillement & craquement du bois, ma bonne vieille! n'est pas un presage funeste ou Signe de mort, mais seulement un effet de la variation du temps, & par consequent tout naturel & point extraordinaire.

Mais si on veut aussi découvrir les autres Parties, alors on a besoin du meilleur Microscope qu'on puisse trouver.

Moyennant un bon Microscope on voit à une Coupure horizontale 1) au milieu la Moëlle, qui consiste en des Cellules hexagones difformes (a) Fig. ⊙. 2) Differentes tendres Fibres, qui s'étendent du Circuit de la Moëlle jusqu'à l'Ecorce ou à la dernière Périphérie du Bois, comme les Lignes du Cadran (b), entres lesquelles se trouvent des Fibres plus epaises & plus fortes (c). Ne sauroit-on pas croire que les Prémières soient les Fibres du Bois, & les plus épaises fassent les Soupiraux. Je tacherai de rendre cette conjecture plus plausible à l'occasion du Sarment. Pour moi je le présume à cause des Points ou Ouvertures qu'on trouve dans le Circuit de l'Ecorce, puisqu'ils font la même Action que ces Lignes.

3) On découvre une quantité de petites Ouvertures rondes (d), qui se montrent pourtant par le plus fort Microscope presque hexagones, en partie ovales, & en partie quarrées oblongues. Elles ne font autre chose que des Orifices ou Ouvertures des Tuyaux coupés perpendiculairement, qui parcourent à la ligne toute la Tige à sa hauteur depuis la Racine jusqu'à la Couronne.

4) On voit des Cercles ronds de Fibres, entrelassés comme des Fascines qui tournent tout autour, que *Malpigh* a nommé Enveloppes, & qui marquent l'Age de l'Arbre par cette raison (e), parce qu'un tel nouveau Cercle naît tous les ans dans le Bois. Apparement ne sont-ils que de simples Fibres du Bois, qui n'ont point d'autre déstination que de serrer & lier solidement les Particules du Bois, pour donner parlà la solidité à la Tige. Entre ces Fibres on apperçoit des Orifices des Vases, qui passent la Tige perpendiculairement,

5) On apperçoit de plus les Couches de l'Ecorce (f), à laquelle on ne peut voir dans une telle coupure horizontale que le Tissu des petites Vesicules ou Utricules.

Les Physiciens auront surement de l'obligation à celui, qui sauroit découvrir d'avantage dans une telle petite

mes genommen worden ist, entdecken kan, wird alle Liebhaber der Naturkunde sich ungemein verpflichten, wann dessen Gefälligkeit solches bekannt machen wollte. Alles was etwann noch betrachtet werden mögte, könnte das häutige Weesen oder das Zellengewebe seyn, womit der ganze Stamm, zwischen denen sämmtlichen Gefäsen und Fasern, versehen ist, und wovon ich so gleich ein mehrers bekannt machen werde, weil man diesen Hauptheil des Baums, deutlicher, in einen Perpendicular-Schnitt sehen kan, den ich nun erklären will.

petite Particule du Bois, qui a été coupée de la Tige, à l'épaisseur, & non pas à la Longueur, s'il vouloit communiquer ses Découvertes au Public. Tout ce que l'on y pourroit encore observer, seroit cette Substance de Peaux ou le Tissu, duquel toute la Tige est garnie entre les Vases & les Fibres, dont je parlerai tout de suite plus, puisqu'on peut mieux voir cette Partie essentielle de l'Arbre dans une Coupure perpendiculaire, ce que je vais expliquer tout à l'heure.

Als ich einen kleinen Spahn von dem Ast eines Birnbaums genommen, dessen Frucht in künftiger Herbst-Sammlung nach ihrer natürlichen Gestalt, Farbe und Gröse mit vorkommen soll, und der ohngefehr zehenjährig ware, auch denselben durch alle Vergrösserungen genau betrachtet hatte, sahe ich sehr deutlich, durch ein paar der grösten Vergrösserungs-Gläser, daß alle Fibern, Fasern, Röhrchen und Canäle, mit einer sehr zarten, dinnen und durchsichtigen Haut, zusammen verbunden waren, welche demjenigen weissen Silberhäutgen ähnlich kommt, das man in vielen Capseln, Hülsen und Schaalen, von Schottenfrüchten siehet, und womit gemeiniglich die Bohnen als in einen weissen Atlas, eingehüllt zu seyn pflegen.

Ayant pris un petit Eclat de la Branche d'un Poirier, le Fruit duquel doit paroître dans la Recolte de l'Automne, dessiné à sa Figure, Couleur & Grandeur Naturelle, qui étoit agé environ de dix ans, & l'ayant observé exactement par tous les Microscopes, j'y voyois très distinctement, moyennant une Couple de plus forts Microscopes, que toutes les Fibres, Fibrilles, Tuyaux & Canaux étoient liés ensemble par une Pellicule tendre, fine & transparente, qui réssemble à cette Cuticule argentée que l'on trouve dans beaucoup de Capsules, Cosses & Ecorces de Légumes, & avec laquelle les Haricots sont enveloppés ordinairement.

Man entdeckt aber diese Haut nicht anderst, als durch die Hirskornförmigen Gläsgen Numer 1. o. u. oo. Sie bedeckt alle Röhrgen und Fibern, und diese Gefäse stehen in ihr, gleichsam als in einem Futterall, wie die Orgelpfeiffen, oder wie man gewisse biegsame Futterale zu denen Querflöten, von weichen Leder macht, die sich zusammenrollen lassen. In dieser zarten glänzenden Haut, siehet man hier und dar, bald grösere bald kleinere Löcher, und eine Menge verschiedener gerader Gefäse und Fasern.

On ne découvre pourtant cette Pellicule que par les Lunettes Num. 1. o. & oo. Elle couvre tous les Tuyaux & Fibres, & ces Vases sont plantés dans elle, comme dans un Etui, tout comme les Tuyaux d'Orgues, ou comme on fait de certains fourreaux pliables de cuir tendre, que l'on peut rouler, pour y garder les Flûtes traversières. On voit dans cette Pellicule cà & là tantôt de plus petits Troux, & une quantité de differents Vases & Fibres, qui montent en droiture.

Ich getraue mir nicht, diese Gefäse mit einem eigenen Namen zu benennen, weil ich die Würkung derselben im Holze selbst, nicht habe sehen noch entdecken können. Ich entlehne daher von andern ihre Benennung, welche die Spiral-Röhrgen B, für die Luftgefäse angesehen, dergleichen nebst andern du Hamel geglaubet.

Je n'ose pas donner de propres Noms à ces Vases, parce que je n'ai pas encore pû découvrir leur fonction dans les Bois. C'est pourquoi je vais emprunter leurs Noms des autres Ecrivains, qui ont pris les Tuyaux tournés en vis ou Ligne spirale (B) pour les Trachées, comme *du Hamel* croyoit entre autres, quoique *Malpigh* en prit les Canaux larges C.

Meines Orts sahe ich die Röhrchen C. für die Wassergefäse an, weil ich würklich Wasserblasgen darinnen noch beweglich gefunden, da ich vom Baum, den Ast und Spahn frisch abgeschnitten habe, und alles noch voll Feuchtigkeit gewesen ist. Sie sind hol und sehr weit gegen denen übrigen. Die Fibern D. erkenne ich für diejenigen, so den eigenen Saft enthalten; denn man siehet auch schon mit blosen Augen, braunrothe Streifen im Holz, welche Farbe von diesem Saft verursachet wird. Sie waren auch voll mit kleinen braunen Saftkügelein angefüllt. Vielleicht ist es der Saft, der denen Birnen ihren eigenen Geschmack gibt. Die übrigen dünnen, schmalen, zärtern Fasern, halte ich für die wahren Holztheilchen oder fibras ligneas, und glaube, daß die Ausführungsgefäse nicht hierunter befindlich sind, als welche ich in der halben Querscheibe, mit dem Buchstaben c. bezeichnet habe, und die durch die Rinde ihren Ausgang nehmen. Die kleinen Löcher oder Oeffnungen in der Haut A. möchten die

Pour moi je prends les Tuyaux C. pour les Vases qui contiennent les Eaux, parce que j'y ai trouvé effectivement des Ampoules encore mouvantes, lorsque j'ai coupé la Branche & l'Eclat fraichement de l'Arbre, & que tout étoit encore rempli d'humidité. Il sont creux & très larges en comparaison des autres. Je prends les Fibres. D. pour celles, qui contiennent le Suc Propre; car on voit déja sans Lunette des Rayes roussâtres dans le Bois, & cette couleur a été causée par ce Suc. Elles étoient aussi remplies de petits Globules de Suc brunâtres. Peut-être n'est autre chose que cela, qui donne ce Goût particulier aux Poires. Je tiens les autres Fibres subtiles, étroites & tendres, pour les veritables Parties ou Fibres du Bois, & je crois que les Soupiraux n'y sont point compris, lesquels j'ai designé par litt. c. à la rouelle, & qui sortent par l'Ecorce. Je prends les petits Troux ou Ouvertures dans

die Oeffnungen derer Utrickeln seyn, und vermuthe, daß diese Haut, aus dem Mark entstehe und zu gleicher Zeit von Jahr zu Jahr, mit einem neuen Zirkel oder Involucro, sich ausbreite und ausdehne, welches man an denen Laagen der Rinden und ihrer Substanz, nicht undeutlich abnehmen kan.

Die g. L. werden verhoffentlich von mir nicht verlangen, daß ich bey der Erklärung dieser Tafel ein mehrers von Einer Figur, anbringen sollte. Ich gedenke aber, in folgenden Blättern vollends nachzuholen was man etwa noch zu wissen begehren möchte, besonders was die Beschaffenheit der Rinden, ihrer Utrickeln, des Marks, des Zellengewebes und anderer Theil betrift; zumalen wann ich den Bau von solchen Stengeln abbilden und darstellen werde, welche von einer weichern Beschaffenheit sind, wie z. B. von Pflanzen die gefärbte Säfte haben, und wo sich die eigenen Gefäse deutlicher erkennen lassen. Biß dahin wiederhole ich noch, mehrer Deutlichkeit willen, ganz kürzlich, was beede Figuren von Holzspähnen enthalten und besagen.

Figur ⊙ stellet im kleinen vor, was auf der 1. Tafel mit Fig. 16. und 17. angezeigt worden, nemlich an einen Querschnitt von Apfelholz,

a. Das Mark.
b. Die Holzfasern.
c. Die Ausführungsgefäse.
d. Löcher, in den Zwischenräumgen welche die Mündungen der Perpendikular-Gefäse sind.
e. Die Jahrgänge oder Involucra, welche als ein Zaungeflechte im Zirkel herum lauffen und zur geraden Aufrechthaltung und Vevestigung des ganzen Stammes, dienen.
f. Die Rinden, welche aus dem Zellengewebe und Utrickeln bestehen, mit untermischten durchflochtenen Fibern und Gefäsen.

Figur C. Ein perpendikular geschnittenes Theilgen vom Holz eines Birnbaums, in natürlicher Grose.

Figur ♂. Dasselbe auf das stärkste vergrössert: An demselben zeiget

A. das zarte Häutgen, so das sämmtliche Holz und alle Gefäse und Fibern, umgibt. Am deutlichsten siehet man es im Splint oder jüngern Jahrgängen des Stammes, so gleich nach denen Rinden Laagen, folgen: mit seinen Oeffnungen.
B. Die Schraubenförmigen Spiral- oder Luftröhrgen.
C. Diejenigen grosen weiten Röhren, so ich für Wassergefäse halte.
D. Die Gefäse des eigenen Safts.
E. Die Holzfasern mit untermengten Utrickeln.

Fig. ♀. zeigt ein Theilgen davon noch mehr vergrösert, mit dem Häutgen A. einem grossen Wassergefäß, C. und einem eigenem Saftgefäß D.

la Peau A pour les Ouvertures des Utricules, & je présume que cette Peau naît de la Moëlle, & s'étende & allonge en même tems annuellement par un nouveau Cercle ou Enveloppe, ce que l'on peut assès vraisemblablement conclurre par la Substance & les Couches de l'Ecorce.

Mes Lecteurs n'exigeront point de moi, à ce que je crois, que je dise davantage d'une Figure, dans l'explication de cette Table. Je pense pourtant bien achever à dire dans les feuilles suivantes, tout ce que l'on pourroit souhaiter d'en savoîr encore, surtout ce que regarde la Disposition de l'Ecorce, de ses Utricules, de la Moëlle, du Tissu, & des autres Parties; principalement lorsque je représenterai la Structure de telles Queues, qui sont d'une Constitution plus tendre, comme on voit par exemple aux Plantes qui ont des Suc colorés, où on peut alors mieux connoître les Vases Propres. Jusque là je vais repéter en peu de mots, pour être plus intelligible, ce que les deux Figures de ces Eclats du Bois contiennent & représentent.

La Figure ⊙ fait connoître en petit ce que l'on a indiqué sur la 1. Table par les Figures 16. & 17. à une Coupure du Bois du Pommier, c'est-à dire

a. la Moëlle.
b. Les Fibres du Bois.
c. Les Soupiraux.
d. Des Troux, qui sont les Orifices des Vases, qui courent perpendiculairement.
e. l'Aubier ou les Enveloppes, qui tournent en rond au tour de l'Arbre comme une Haye, & servent beaucoup à maintenir & assurer toute la Tige.
f. Les Ecorces, qui sont composées du Tissu & des Utricules, avec des Vases & Fibres entrelassés.

La Figure C. Représente une petite Particule du Bois d'un Poirier, coupée perpendiculairement, dans sa grandeur naturelle.

La Fig. ♂. Montre la même, mais très fort grossie. On y voit

A. la Peau tendre & fine, avec ses Ouvertures, qui enveloppe tout le Bois, & tous les Vases & Fibres. On la voit le plus distinctement à l'Aubier ou à ces Accroissements annuels de la Tige, qui viennent tout de suite après les Couches de l'Ecorce.
B. Les Trachées ou les Canaux tournés en forme de Vis ou de Ligne spirale.
C. Les grands & larges Canaux, que je prends pour les Vases des Eaux.
D. Les Vases du Suc Propre.
E. Les Fibres du Bois, melées d'Utricules.

La Fig. ♀. En montre une Particule encore plus grossie, avec la Pellicule A. un grand Vase, qui contient les Eaux, C. & un Vase du Suc Propre D.

Fig. 1.

TAB. IV.



M.F. Ledermüller delin.

A.L. Wirsing Sc. et excudit Norimberg.

Ich will aber diese Erklärung niemanden als infallible aufdringen, sondern einem jedem Liebhaber überlassen, solche zu prüfen und nach Befinden mit einer bessern zu vertauschen. Wenigstens habe ich das zarte Häutgen A. noch nirgend so deutlich angezeigt gefunden, als ich es hier gesehen und vorgestellt habe. Verschiedene schrieben wohl (und mehrentheils einer von dem andern,) als ob sie die Gefäse noch in einer besondern Scheide, gesehen hätten. Alleine so wahr dieses ist, und so sehr es die Entdeckung des ganzen Häutgens bestättiget, so hatten sie doch nur einen Theil des zerrissenen Häutgens wahrgenommen, der diese Gefäse bedeckte. Es kommt hier bloß auf das Glück an, feine Spähne zu machen, und so zart und gleich, daß dieses Häutgen ganz bleibt und nicht zerschnitten wird. Ueberhaupts empfehle ich zu solchen Beobachtungen, jedesmalen, frisches Holz, und, wo möglich, von Bäumen selbsten, Aeste zu nehmen, und sogleich diese frischen Spähngen im Schieber zu bringen, da man sodann gar oft, die Bewegung, der Luftbläsgen auch Saftheilgen, wann man zumal etwas geschwinde damit zu Werke gehen kan, sehen und entdecken wird. (*)

Je ne prétends pourtant point que l'on tienne cette Explication pour infaillible; j'accorde plutôt la Liberté à tous mes Lecteurs de l'examiner, la changer & adopter une meilleure, selon qu'on le trouve bon. Du moins je n'ai trouvé nulle part la Peau fine A. si clairement indiquée, que je l'ai vu ici, & l'ai représenté aussi. Il y en a qui avancent en copiant les autres, qu'ils avoient vû les Vases encore dans un Fourreau particulier. Mais aussi vrai que cela est, & aussi bien que la Découverte de la Peau entière le confirme, ils n'ont pourtant vû qu'une seule Partie de la Peau dechirée, qui couvre ces Vases. Le tout dépend du Bonheur, de savoir faire des Eclats fins, si tendres & egaux, pour que la Peau reste en entier. Pour y reüssir, il faut prendre du bois tout fraiche, d'une branché de l'arbre même; on coupe d'un tel bois un petit éclat, tres fin, & l'applique après, bien vitement entre les deux verres, pour le mettre sous le Microscope, & pour observer enfin le mouvement de l'Air & du Suc (*).

TABULA V.

Ein Stengel mit verschiedenen Blumen von der Martagon oder Heydnischen Lilie, nebst einigen mikroskopischen Beobachtungen an derselben.

Weilen diese schönen Lilien zu gleicher Zeit, neben der Feuer-Lilie, in meinem Gärtgen geblühet, so nahm ich Gelegenheit, sie insgesammt abzubilden, und die verschiedenen Farben derselben, auf einem Stengel vorzustellen. Denn eine jede von diesen Blumen-Arten, prangte auf eigenen Stengeln, und zwar an manchem, 10, 12. biß 15. Glocken. Sie lieben den Schatten, und entspringen aus einer gelben Zwiebel, welche öfters gröser als die stärkste Faust und aus sehr vielen kleinen Zwiebeln zusammengesetzt ist, so ihr die Gestalt einer Artischocke geben. Die Namen dieser Blumen sind mancherley, als z. B.

Lilium Martagon, Asphodelus, Lil. intortum sylvestre, montanum floribus reflexis, flore nutante ferrugineo majus, flore purpurascente sanguineo guttato, Saracenium & Cymbalum, Türkischer Bund, Lilien von der Schedelstätt, von Calvarien, Lippe, Cymbeln und andere mehr.

Ihre grünen Blätter sind nicht allein von der Feuer-Lilie und allen andern Lilien, sehr unterschieden, sondern auch die kleinen Brut-Zwiebeln, die man auf denen erstern zwischen dem Stengel und Blättern siehet, findet man hier niemalen. Desto reicher aber ist ihre goldgelbe Wur-

(*) Weil ich oben von der Luft im Holz, Erwehnung gethan, so will ich hier die g. L. noch besonders auf ein ganz neues Werk verweisen, welches unter dem Titel bekannt worden: Untersuchungen der Natur und Kunst ꝛc. Leipzig 1765. Herausgegeben von Tit. Herrn Professor J. H. Wintler allda, in 8vo, mit Kupfern.

TABLE V.

Une Tige à differentes Fleurs du *Martagon* ou *Lis Payen*, observée microscopiquement.

Comme ce beau Lis fleurissoit en même tems que le Lis doré dans mon Jardin, je pris de là occasion de les designer tous ici, & de représenter leurs differentes Couleurs à une seule Tige. Car chaque de ces Fleurs étoit ornée sur ses propres Tiges de dix, douze à quinze Cloches. Elles aiment l'Ombre & naîssent d'un Oignon jaune, lequel est souvent plus grand que le plus fort Poing, & lequel est composé de beaucoup de petits Oignons, qui luy donnent la Figure d'un Artichaut. Les Botanistes le nomment.

Lilium Martagon, Asphodelus, Lilium intortum, Sylvestre, Montanum floribus reflexis, flore nutante ferrugineo majus, flore purpurascente sanguineo guttato, Saracenium & Cymbalum &c.

Ses Feuilles différent non seulement de beaucoup du Lis doré & de tous les autres Lis, mais aussi les petits Peuples, que l'on voit dans le Lis doré parmi la Tige & les Feuilles, ne s'y trouvent jamais. Son Oignon couleur d'or abonde en

 revan-

(*) Comme j'ai parlé ci-dessus de l'Air dans les Bois, je m'en vais recommander un Ouvrage nouveau, qui a pour Titre: *Recherches de la Nature & de l'Art*, à Leipsic 1765. en 8vo, enrichies de Figures, par Mr. le Professeur J. H. Winkler.

Wurzel-Zwiebel, in der Erde, mit Brut beſezt, welche einen Stengel von 3. biß 6. Schuhen, in die Höhe treibet, an welchem gemeiniglich 12. biß 16. auch öfters zu zwanzig Blumen, hervorbrechen, deren Korolle oder Kranzblätter (petala) insgeſammt, zurück gebogen oder hinterwärts unter ſich gekrümmt und gerollt ſind, ſo, daß ſie einem Türkiſchen Bund ähnlich ſehen. Fig. 1.

Einige waren ganz weiß, (a) andere ſpielten etwas in das Roſenfarbe, (b) wieder andere von dieſer Farbe hatten ordentliche Spiegel, von hell und dunkelrother Roſenfarbe. (c) Ingleichen noch dunklere mit violetten Spiegeln, (d) auch mit hellern Spiegeln, (e) ferners ganz dunkel purpurroth (f), und die mir vor andern gefielen, ſahen weiß, und ſpielten in das grüne mit hoch roſenfarben Spiegeln (g') davon ein noch geſchloſſener Knopf mit (h) angemerkt iſt. An dieſen Blumen iſt ebenfalls kein Calyx oder Becher, befindlich.

Die Corolle aber einer jeden Blume, hat 6. Petala oder Blätter, welche ziemlich dick, ſteif und zurückgekrümmt ſind. Der Piſtill, iſt dem in der Feuer-Lilie, vollkommen gleich. Die Narbe oder das Stigma, hat ebenfalls 3. Theile, wie auch der Griffel; und der Eyerſtock worauf er ſtehet, iſt auch ſechseckigt. Daher ich ſolchen wegen Mangel des Raums, weggelaſſen habe.

Die Staubträger haben purpurfarbe Beutel und goldgelben Antheren-Staub, Fig. 2. (a) der wann er genezt wird, wie b. c. ſiehet. Wird ein ſolches Staubſäckgen älter, ſo erſcheint ſeine Farbe dunkler, wie die Fig. 3. zeigt, woran der durch No. 5. beobachtete Antheren-Staub zugleich mit abgebildet worden. Dieſe Staub-Beutel ſind ſehr klebrigt, gleich wie das Stigma, und daher kommt es, daß auch der Antheren-Staub daran klebend bleibt; denn dieſer Befruchtungs-Staub hat keine Stielgen, wie einige vorgegeben haben, ſondern eine honigartige Materie umgiebt ein jedes Antherenkorn; welche macht, daß öfters 50. und 100. Körner, gleich einer Traube aneinander kleben.

Die 4te Figur bemerket einen kleinen Theil von der Narbe eines Griffels oder Piſtills abgenommen (b) und durch eine ſtarke Vorgröſſerung beobachtet. Hieran ſiehet man erſtlich ſehr deutlich, daß das dreyfache Stigma oder Wärzgen des Griffels, aus unzählich vielen Wärzgen, Drüſen oder papillis beſtehet, ſo, wie faſt die Epidermis der Zunge. Die Papillons halten ſich gerne hier auf; müſſen aber auch gemeiniglich Haar dabey zurück laſſen. Denn als ich die obere Fläche einer ſolchen Narbe, mit dem Vergröſſerungs-Glas überſahe, ſo erblickte ich nicht alleine die gerſtenförmigen Antheren-Staubkörner, ſondern auch eine Menge Federn von Papillonen oder Sommer-Vögeln, welches zu einen Beweiß dienet, daß dieſer Theil des Piſtills, das Stigma, ſehr klebrigt ſeyn müſſe, welches ich auch zu gleicher Zeit aus dem glänzenden Weeſen deſſelben, abnehmen kan, das einem Verniß oder Terpentin nicht viel ungleich kommt. S. Fig. 4. davon das natürliche Theilgen bey Fig. 5. zu ſehen iſt.

Als

revanche d'autant plus en Peuples dans la Terre, qui pouſſent une Tige de trois à quatre Pieds de hauteur, de laquelle ſortent ordinairement douze, ſeize-à-vingt Fleurs, dont la Corolle ou Pétales ſont pliés en arrière ou courbés en deſſous & roulés, de ſorte qu'ils reſſemblent à un Turban. Fig. I.

Il y en avoit qui étoient tout blanches (a), d'autres donnoient dans la Couleur de Roſes (b), encore d'autres de cette Couleur avoient des Miroirs couleur de Roſes brunclair & foncé, C. On y voit d'autres encore plus foncées à Miroirs violets. (d) Auſſi à Miroirs plus clairs (e), de même pourprés tout foncés (f) & celles, qui me plaiſoient le plus, étoient blanches, & donnoient dans le Verdâtre à Miroirs couleur de Roſes (g), dont j'ai repréſenté un Bourgeon encore fermé, litt. (h). Cette Fleur eſt pareillement depourvuë de la Coupe ou Calix.

Mais la Corolle de chaque Fleur a ſix Feuilles ou Pétales, qui ſont aſſès épais, roides & courbés. Le Piſtil répond parfaitement à celui du Lis de Feu. La Cicatrice ou le Stigme eſt de même compoſé de trois Parties comme auſſi l'Aiguille; & l'Ovaire, ſur lequel il eſt planté, eſt pareillement héxagone. C'eſt par cette raiſon que je n'en ai pas parlé faute d'Eſpace.

Les Anthêres ont des Bourſes Couleur de Pourpre, & la Poudre Couleur d'or, fig. 2. (a.) laquelle, étant humectée, a la Figure comme je l'ai fait voir par (b. c.). Si une telle Bourſe devient plus agée, alors ſa couleur paroît plus foncée, comme la fig. 3. montre, où j'ai en même tems deſſiné la Poudre Anthêrique, obſervée par la Lentille Num. 5. Ces Bourſes ſont très visqueuſes, comme le Stigme, & de là vient que la Poudre Anthêrique s'y attache; car cette Poudre fructifiante n'a point de Queuës, comme quelques uns ont avancé mais; c'eſt plutôt cette Matière mieleuſe, qui environne chaque Grain d'Anthêres & qui fait, que fort ſouvent 50. à 100. Grainés s'entre tiennent tout comme un Raiſin.

La 4ème. Figure remarque une petite Particule de la Cicatrice d'une Aiguille ou Piſtil, coupée (b) et obſervée par le plus fort Microſcope. On y voit prémièrement très diſtinctement que le triple Stigme ou Verrüe du Piſtil conſiſte en une grande quantité de Verrües, Glandules ou Papilles, tout comme l'Epiderme de la Langue. Les Papillons y demeurent volontiers, mais ils y laiſſent communement de leurs plumes. Car ayant regardé la ſuperficie d'une telle Cicatrice avec le Microſcope, je n'y ai non ſeulement découvert les Grains de Poudre Anthêrique en forme d'Orge, mais auſſi une quantité de Plumes de Papillons, & cela prouve que cette Partie du Piſtil, le Stigme, doit être très gluant, ce que je puis en même tems conclurre de ſa Subſtance luiſante, qui reſſemble aſſès au Vernis ou à la Térébenthine, voyès la 4. figure, & la figure 5. vous en préſentera une Particule naturelle.

Ayant

TAB. V.

Fig. 1.

7.

8.

e

9.

10.

11.

2.

c c b a a

12.

h

d

g

6.

c

b

f

b.

a

3.

5.

4.

M. F. L. del

A. L. W. Sc.

Als ich endlich einen ganzen Griffel zur Hand genommen und seine Wärzgen auf das Gläschen eines Schiebers, gedruckt, so sahe ich beynahe eben das, nehmlich Federn von Schmetterlingen (α) Antherenstaubkörner (β) und die fette klebrigte Substanz (γ) welche vielleicht dem aufgesprungenen Antherenstaub, der auf diesen Narben lag, zuzuschreiben ist, und allerley unförmliche Figuren vorstellet.

Ayant enfin pris un Pistil entier, & ayant collé son Stigme sur un Verre, j'y ai vû presque la même chose, c'est à dire des Plumes de Papillons (α) des Grains de la Poudre Anthérique (β), & cette substance grasse & gluante (γ), laquelle on doit peut-être attribuer à la Poudre Anthérique, qui s'est crévée, & qui étoit couchée sur cette Verruë, & représentoit des Figures difformes.

Wann der Griffel abgefallen, so wird der Eyerstock von Tag zu Tag gröſser, und endlich so groß, als die Fig. 7. 8. zeigt; welcher quer durchschnitten mit seinen 6. Fächern Fig. 9. und perpendikular mit dem weisen Silber- oder Permenthäutgen Fig. 10. ohne dasselbe aber Fig. 11. angezeigt worden, um die Laage seiner Saamenkerne zu zeigen. Ein jedes von diesen sechs Saamenfächern, in der ganzen Kapsel, ist mit diesem zarten doch sehr starken Häutchen ausgefüttert, und dient denen darunter liegenden Saamenkernen auch zu gleicher Zeit zur Bedeckung, so daß sie gleichsam wie unter einem Vorhang vom reinsten Silber-Mor oder weissen Taffend, verwahrt liegen. S. Fig. 10.

Aussitôt que l'Aiguille est tombée, alors l'Ovaire grossit de jour en jour, & devient à la fin si grand, comme les Figures 7. & 8. montrent; nous avons indiqué cet Ovaire coupé obliquement avec ses 6. Capsules, fig. 9. & perpendiculairement avec cette Peau argentée fig. 10. & sans celle-ci figure 11. pour faire voir la Couche de ses Pépins. Chaque de ces six Cassetins de Semence dans toute la Capsule est doublé de cette Peau très fine & neanmoins très forte, & sert en même tems à couvrir les Pépins couchés dessous, de sorte qu'il semble qu'ils demeurent derrière un Rideau de Moire argentée ou de Satin très blanc, voyés la fig. 10.

Fig. 12. Ist endlich ein reifer Saamenkern, der anfänglich, wie in der Feuerlilie, weiß ist. S. Fig. 9. dann aber gleich der ganzen Kapsel, rothbraun wird, und mit einem zarten etwas runzlichten Häutgen, rings herum eingefaßt ist. Die 8. Figur stellet die Kapsel vorwarts gerichtet vor, um theils den Mittelpunckt zu zeigen, wo der Griffel gestanden, theils die Eintheilung der Sechsecke, etwas deutlicher zu machen.

La Figure 12. montre un Pépin meur, lequel est au commencement blanc, comme dans le Lis de feu, fig. 9. mais qui devient après comme la Capsule entière, roussâtre, & qui est bordé tout au tour d'une Peau tendre & un peu ridée. La fig. 8. représente la Capsule tournée en avant, tant pour pouvoir montrer le Centre où l'Aiguille étoit plantée, que pour rendre plus intelligible la Distribution des Hexagones.

Der Antherenstaub Fig. 2. springet nicht so leicht im Wasser auf wie bey der Feuerlilie, wird auch nicht so rund, sondern mehr Eyrund oder Conisch, und seine Spalte in der Mitte, bleibt allezeit sehr kenntlich, auch im Wasser.

La Poudre Anthérique ne se creve pas si facilement dans l'eau comme celle du Lis de Feu, elle ne devient non plus si ronde, mais plus ovale ou Conique, & sa Crévasse au milieu reste toujours très connoissable, même dans l'eau.

TABULA VI.

Ein blauer Stern-Hyacint, mit seiner Zwiebel und dem vergrösserten Zwiebelhäutgen.

So klein diese Blume, so reizend ist ihr prächtiges Königsblau, womit sie ihr Schöpfer ausgeschmücket hat. Betrachtet man ihre Farbe durch das Suchglas, so übertrifft sie Ultramarin und man kan nichts schöners sehen, als das Oberhäutgen eines solch niedlichen Blates dieser Blume, welches wegen derer darunter liegenden und durchspielenden Saftgefäße, sich wohl entzuckend genug im Mikroskop betrachten, aber nicht beschreiben lässet.

TABLE VI.

Une Jacinte d'Etoiles bleue, avec son Oignon, & la Peau de l'Oignon grossie.

Tant petite que cette Fleur soit, tant attirant est son magnifique Bleu du Roy, dont le Créateur l'a orné. Si l'on observe cette Couleur par la Lentille, elle surpasse le Ultra Marin (Outre Mer), & on ne sauroit voir rien de plus beau que la Cuticule supérieure d'une telle jolie Feuille de cette Fleur, laquelle, à cause des Vases transparents du Suc, qui sont couchés dessous, on peut mieux observer par le Microscope avec enchantement que d'écrire.

Mit der ersten Figur, habe ich hier auf dieser sechsten Tafel eine Zwiebel abgebildet, welche drey Blumen, nehmlich 2. offene a. b. und und einen geschlossenen Knopf c. zwischen vier dunckel grünen Blättern d. getrieben hatte. Viele dieser Zwiebeln, bringen öfters mehr als einen Stengel e. e. hervor, der über der Schaale der Zwiebel, rosenroth hervorkommt, dann aber diese Farbe verliehret, und weiß wird. Die äusserste dünne Haut der Zwiebel, ist schwarzbraun f. die Wurzel g. aber weiß. Wird diese Haut abgenommen, so siehet man auch die andere Zwiebel als einen Zwilling h. noch in einer aschgrauen Schaale eingehüllet, jedoch zusammen gewachsen, welche, wann sie von einander gesondert werden, die Figuren i. k. vorstellen.

Mit der Figur l. habe ich zeigen wollen, wie die vielen Schaalen der Zwiebel, aufeinander liegen und sich von fornen zusammenschliesen.

Zerschneidet man aber eine solche Zwiebel, nach der Quere und nach der Länge, und betrachtet sie durch das Suchglas, so findet man die Lagen der Häute, so wie sie die Figuren m. und n. darstellen.

Diese Zwiebelhäutgen sehen nun einander sehr ungleich, wenn man sie genau betrachtet. Denn die äussersten sind sehr belzig und schwammigt, und lassen durch das Vergrösserungs-Glas nicht das geringste weiters erkennen, als daß ihr Weesen aus lauter dicht aufeinander liegenden Utrikuln, gleich dem belzigten weissen Fleisch in den Zitronen und Pomeranzen, bestehe. Dienigen Schaalen aber, so tiefer innen liegen, haben äusserlich ein sehr glänzendes feines, glattes Häutgen. Von diesem nahm ich etwas ab. S. Fig. o. wo ich das abgeschnittene Theilgen, in natürlicher Grösse angezeigt habe, betrachtete es hernach durch Nummer oo. und sahe es, wie die Figur p. solches getreulich vor die Augen leget. Ich entdeckte daran, daß es aus lauter gerad und schreglauffenden Saftröhrgen und einer sehr feinen Membrane oder zartesten Häutgen bestehe, so man sich nur einbilden kan.

Nach dieser Beobachtung, zergliederte ich dann die Blume und bemerkte daran sechs himmelblaue oder Ultramarinblaue Blätter (petale) (q), welche die Korolle machen, so keinen Kelche hat. Hinten am Stiele oder gegen das Germen zu, sind sie blendend weiß.

So wie sie an dem an sich sehr schwachen Stielgen bevestiget sind, stehen auch gleichergestalt an demselben um das Germen herum, die sechs Griffel mit ihres Antheren r. so ebenfalls blau sind; doch mehr dunkeler an Farbe, als die Blätter.

Das Germen (s) so grün und Eyrund gleich einer Zitrone ist, bestehet gleichergestalt aus 6. Fächern, und auf dessen Mittelpunkt stehet der Griffel, der oben sehr spizig zuläuft, und fast gar kein Stigma erkennen lässet (t), es sey denn, daß man es durch die höchste Vergrösserung betrachtet, da sich alsdenn die Narbe, gleich einer geschnittenen Schreibfeder, zeigt.

Die 3. Theile des zerschnittenen Eyerstocks u. u. u. zeigen die Lagen der Embryonen, welche auch hier, durch den

J'ai dessiné ici sur cette sixième Table par la première Figure un Oignon, qui poussoit trois Fleurs, c'est à dire, deux ouvertes. a. b. Et un Bourgeon encore fermé c. entre quatre Feuilles, qui tiroient sur le verd foncé. d. Une quantité de ces Oignons poussent fort souvent plus d'une Tige e. e., qui est d'abord Couleur de Roses, mais qui change de sa Couleur, & devient blanche. L'Epiderme de l'Oignon est bay brun f., la Racine au Contraire blanche. g. Si on ôte cette Peau, alors on voit aussi l'autre Oignon comme un jumeau h., enveloppé dans une Peau gris cendrée, pourtant en un même corps, qui, quand on les sépare, donnent les figures i. k.

J'ai voulû montrer par la Figure l., comme cette quantité de Peaux de l'Oignon se couchent l'une après l'autre, & se ferment à la pointe.

Mais si on coupe un tel Oignon au long & au large, & l'observe par la Lentille, alors on trouve les Couches des Peaux comme les figures m. & n. montrent.

Ces Peaux des Oignons différent beaucoup l'une de l'autre, quand on les observe de près. Car celles au bord sont fort spongieuses, & ne font rien connoître de plus par le Microscope, si non que leur Etre consiste en Utricules couchés dru l'un contre l'autre, qui ressemblent à ce cuir blanc dans les Citrons ou Oranges. Mais les Peaux, qui sont plus en dédans, ont exterieurement une Pellicule très luisante, très fine & tres unie. J'en ai pris quelque chose, voyès la fig. O, où j'ai montré cette Particule coupée dans sa grandeur naturelle, je l'ai observé après par la Lentille Num. oo. & elle avoit la mine, comme la fig. p. la met fidélement devant les yeux, où je decouvris alors qu'elle étoit composée de Tuyaux de Suc, qui courent perpendiculairement & obliquement; & d'une Membrane aussi fine, qu'on ne sauroit s'imaginer.

Après cette Observation j'ai disséqué la Fleur, & y ai remarqué six Feuilles ou Pétales d'un Bleu celeste ou Outre Mer q., qui font la Corolle, qui n'a point de Coupe. Ces Feuilles-là sont blanches à la Queuë ou vers le Germen.

Comme elles sont attachées à leurs foibles Queuës, les six Anthères avec leurs Verruës r. y sont tout de même rangés autour du Germen, lesquels sont également bleu, cependant un peu plus foncés en couleur que les Feuilles.

Le Germen s., qui est verd & ovale de figure comme un Citron, est pareillement composé de six Cassetins, au Centre duquel est planté l'Aiguille, qui est par en haut fort pointuë, & à laquelle on ne peut presque point connoitre le Stigme t., à moins qu'on l'observe par le plus fort Microscope, où alors la Cicatrice se montre tout comme une Plume taillée.

Les trois Parties de l'Ovaire disséque u. u. u. font voir les Couches des Embrions, qui obtiennent

aussi

TAB. VI.

Fig. 1.



M.F.L. del.

A.L.W. Sc.

den Griffel, vermittelst einer allgemeinen Scheidewand, durch welche eine Hauptröhre gehet, ihren Wachsthum erhalten; Die Embryonen sind durch kleine hole Stielgen oder Röhrgen, an diesen Haupt-Kanal bevestiget, welches die Figur (2) etwas deutlicher vorstellet, wo (3) den Griffel (4) die Scheidewand, welche die Fächer macht, (5) den durch dieselbe lauffenden Haupt-Saftkanal (6), die Embryonen und (7) die mit dem Hauptkanal, und den Embryonen verbundene Stielröhrgen, wodurch denen Embryonen der Saft zufliesset, zu erkennen geben wird.

Zwey Antheren sind mit V. V. etwas durch das Suchglas vergrössert noch angebracht worden, welche blau und gelb vermischten Antherenstaub führten, der mit X. trocken und Z. im Wasser abgebildet ist, wo er dasselbe Purpurroth gefärbet hat, als er aufplazte.

aussi ici par l'Aiguille, moyennant une séparation, par laquelle un Tuyau principal passe, leur Végétation; puisque les Embrions sont affermis à ce Canal principal par des petites Queües creuses, qui sont des Tuyaux, ce que la Fig. 2. montre un peu plus distinctement, lorsque le nombre 3. fera connoître l'Aiguille, 4. la séparation qui forme les Cassetins, 5. le Canal principal du Suc qui passe par elle, 6. les Embrions, & 7. fera voir par la Lentille les petits Tuyaux des Queuës, qui sont liés avec le Canal Principal & les Embrions, & qui procurent le Suc aux Embrions.

J' y ai ajouté deux Anthêres, marqués V. V. un peu grossis, la Poudre Anthérique desquels étoit bleue & jaune, & que j'ai dessiné & marqué litt. X. étant seche, & litt. Z. étant mise dans l'eau, ou elle rendoit l'eau pourprée, lorsqu'elle s'est crevée.

TABULA VII.

Blüth und Holz vom Weinstock.

Es scheinet, daß die Natur ganz besondere Vorsorge für die vorzüglichsten Theile dieses edlen Gewächses, getragen habe. Die Blühtblumen desselben, haben eine Bedeckung, welche man nicht leicht bey andern Pflanzen und Bäumen, gewahr wird, und diese verwahrt die Befruchtungstheile vor allen äusserlichen Zufällen auf das genaueste und sicherste.

Ich verhoffe keinen weitern Beweiß hierzu nöthig zu haben, als mich auf die Vorstellungen selbsten zu beziehen, welche diese Kupfertafel enthält.

Hier ist eine kleine Ranke von einem Weinstock abgebildet, welcher aus den Saamenkernen trockener grosser Rosinen, noch von meinen seel. Vater gezogen worden; Mit Blättern und einer blühenden Traube.

Das Rebenholz, so unansehlich es anzusehen, wenn es alt ist, so angenehm fällt es in das Aug, wenn es noch in seiner Jugend grünet, indem es eine angenehme Vermischung der rothen und grünen Farbe enthält, welche man mit Vergnügen betrachtet.

Und ob man schon an dem alten Holz, fast gar keine Epidermis oder äusserliche Rindenhaut, sondern statt derselben schwarze oder aschgraue zerfezte Fasern siehet, so entdeckt man doch an den jungen Reben, dieselbe desto deutlicher; ja man kan wohl an keinem andern Holz die Ausführungsgefäse so deutlich durch die Rinde von aussen schon sehen, als am Holze des Weinstocks.

Wie dann überhaupts alle Theile desselben, sich ganz ungemein hell und deutlich, durch das Vergrösserungsglas, unterscheiden lassen.

Derje-

TABLE VII.

La Fleur & le Bois de la Vigne.

Il semble que la Nature ait eu un soin particulier des nobles Parties de cette Plante admirable. Ses Fleurs sont pourvuës d'une Couverture, que l'on trouve fort rarement parmi les autres Plantes & Arbres, & elles servent à garantir les Parties Génitâles de tout accident le plus exactement & surement.

Je n'ai pas besoin de chercher d'autres preuves pour établir cette verité, que celles que nous presentent les Représentations de cette Table.

Voici un petit Pampre d'un Sarment, que defunt mon cher Pere a planté & élevé des Pepins de Raisins gros & secs, avec ses Feuilles & une Grappe de Raisin fleurisante.

Tant vil & informe qu'il est le Bois du Sarment, quand il est vieux, autant est il agreable dans sa Jeunesse parcequ'il contient un mélange charmant du Rouge & Verd, que l'on regarde avec Plaisir.

Et quoique le vieux Bois ne nous donne presque plus à remarquer, que des Fibres dechirées noires gris cendrées au lieu de l'Epiderme; on découvre en revanche l'Epiderme aux jeuns Sarments plus distinctement; encore plus, on ne sauroit voir en aucun autre Bois passer les Soupiraux par l'Ecorce déja en dehors qu'au Bois du Sarment.

On peut très clairement & evidement distinguer généralement toutes les Fibres & Fistules par le Microscope.

Celui

Derjenige der ſich darüber wundert, und wer kan dieſes wohl unterlaſſen, wann er das zerriſſene gleichſam verdorrete Holz eines alten Weinſtocks anſiehet, welches doch ſo herrlich und erquickende Früchte hervor bringt, wird die Urſache ſchon ehender begreiffen können, wann ihme die Vergröſſerungslinſe zeigt, daß faſt kein anderes Holz ſo weite und ſo viele Saft- und Luftröhrgen, dagegen aber ſo wenig veſte Holzfaſern habe, als das Rebenholz; dahero dann auch vielleicht die Urſache herzuleiten, warum es vor andern ſo leicht iſt.

Celui, qui en eſt tout etonné, & qui eſt-ce qui ne le ſeroit point? quand il regarde ce Bois dechiré & quaſi deſeché d'un vieux Sep, qu'il produit pourtant des Fruits ſi excellents & admirables, celui dis-je en comprendra plus facilement la raiſon, quand le Microſcope lui montre, que preſqu'aucun autre Bois ait d'un Coté des Tuyaux du Suc & des Trachées ſi larges & en ſi grande Quantité, & de l'autre Coté ſi peu de Fibres du Bois impénétrables, que le Sarment; peut-être eſt cela bien la raiſon, pourquoi ce Bois eſt plus léger que tout autre Bois.

Ich habe, um dieſes alles beſſer zu begreiffen, auch einen Querſchnitt von dieſem Holz abgebildet, und damit ich nicht ohne Noth weitläuftig werde, will ich ſogleich die Figuren ſelbſt, erklären.

J'ai repreſenté un Eclat horizontale de ce Bois, pour mieux faire comprendre ce que j'ai dit, et à fin que je ne ſois point trop diffus ſans neceſſité, je m'en vais expliquer les Figures mêmes.

Figur A. Iſt ein Theil einer Weinranke, mit noch jungen Frühlingsblättern a. Zur Seite aber zeigt ſich eine blühende Traube, welche mehrentheils noch geſchloſſene grüne Blüthknöpfe b. und einige offene c. ſehen läſſet.

Fig. A. Eſt une Partie d'un Pampre à jeunes Fleurs du Printems, a. Mais à côté ſe montre une Grappe de Raiſin fleuriſſante qui nous preſente ordinairement de Boutons verds encore fermés, b. & quelques Boutons ouverts, c.

Anfänglich wird man die grünen 5. Abtheilungen eines jeden Blumenknopfes, gar leicht für Blätter einer Corolle oder des Kelchs halten können, wenn man noch keine beſondere Erfahrung von dieſem Gewächſe hat. Allein ſo bald nur die Staubträger ſo ſtark ſind, daß ſie ſich ſteif auf richten können, ſo heben ſie auch dieſe Bedeckung, gemächlich in die Höhe, d. und werfen endlich dieſelbe gar ab. e.

D'abord on prendra facilement ces 5. Parties verdes de chaque Bouton pour des Feuilles d'une Corolle ou de la Coupe, quand on ne la connôit point par une experience particuliere. Mais auſſitôt que les Anthêres ont obtenu tant de force, qu'ils peuvent ſe dreſſer, ils ſoulevent alors tout doucement cette Couverture (d), & la jettent à la fin totalement (e).

Alsdenn ſiehet man den Eyerſtock f. oder die kleine grüne Beere, welche das Behältnis des Saamens oder der Kerne iſt, und um daſſelbe herum die 5. Staubträger, mit ihren gelben Antheren g. auf dem Boden des Kelches oder Necktarii h. aufgepflanzt.

On voit alors l'Ovaire (f) ou ce petit Grain verd, qui garde la Semence ou les Pepins, & autour de lui les 5. Porteurs de l'Anthêra avec ſes Anthêres jaunes (g), plantés au fond de la Coupe ou du Nectaire (h).

Hier macht die junge Beere den Piſtill, der keinen Griffel, ſondern nur ein Wärzgen ff., und den Eyerſtock f. hat. Und weil man an dem Ort, worauf dieſer mit denen Staubträgern ſtehet, gar keine Blätter ſiehet, ſondern nur einen Schüſſelteller ähnlichen Plaz, ſo weiß ich nicht, ob man mit Recht denſelben einen Kelch und nicht vielmehr das Necktarium nennen kan? welches ich gröſſern Naturforſchern überlaſſe.

C'eſt là, où le Grain verd forme le Piſtil, qui n'a point d'Aiguille, mais ſeulement une petite Verruë (ff), & l'Ovaire (f). Et comme on ne voit point de Feuilles, dans l'endroit où il ſe trouve ordinairement avec les Anthêres, mais ſeulement une Place ſemblable à une Aſſiète, je ne ſais pas, ſi l'on ne devoit l'appeller avec plus de raiſon Nectaire que Coupe? J'en laiſſe la Deciſion à des Phyſiciens plus habiles que moi.

Das platte Wärzgen ff. aber, welches anfänglich die Beere zugeſpizt, gleich einem Fläſchgen darſtellet, verliehret ſich nach und nach, indem der Eyerſtock immer mehr und mehr aufſchwillet, und endlich daſſelbe dergeſtalt dadurch ausdehnet, daß es zugleich mit der Beere rund wird. Doch wird man an allen reifen Beeren einer ganzen Traube, noch den Punkt ſehen, den dieſes Wärzgen verurſacht und zuruck gelaſſen hat.

Mais la Verruë unie (ff), qui au commencement rendoit le Grain pointu, & lui donnoit la forme d'une Bouteille, ſe perd petit à petit, parce que l'Ovaire groſſit de plus en plus, & l'etend finalement par là ſi fort, qu'elle devient ronde en même tems avec le Grain. Cela n'empeche pourtant pas, que l'on ne puiſſe voir le Point aux Grains murs d'une Grappe entière, que cette Verruë a cauſé & laiſſé en arrière.

Dieſe Theile insgeſammt, ſind, wie ſchon gedacht, mit einer Decke überzogen, ſo aus fünf Theilen beſtehet, und anfändlich grün iſt l. Sie ſind mit dem Nektario h. zuſammen gewachſen.

Toutes ces Parties en général ſont garnies d'une Couverture, (comme j'ai dit ci-deſſus) qui eſt compoſée de 5. Particules, & qui eſt verde au commencement (l). Elles font un même Corps avec le Nectaire (h).

TAB. VII.

Fig. A.

M.F.Ledermüller delin.

A.L.Wirsing Sc. et excud. Norimberg.

Diese Kappe aber wird nach und nach fahl, dann braun und dürre m., und fällt endlich ab. Zu noch deutlichern Begriff stellet

B. eine Blume mit dem grünen

C. eine andere mit bereits erhobnen braunen Käppgen vor.

D. Noch eine dritte mit abgeworfenen Käppgen und

E. dasNectarium mit seinen fünf Staubträgern alleine; sämtlich durch Nr. 6. vergrössert.

An der blühenden Traube b. waren einige Papillon-Eyer, welche wie Perlenmutter glänzten n. und durch das Vergrösserungs-Glas Nr. 6. sich ansehen liesen wie o. und p. zu erkennen giebt. Sie waren insgesamt mit Deckeln versehen, und spielten in alle Farben des Regenbogens.

Das Holz durch ein schlechtes Suchglas betrachtet, stellet schon deutlich vor Augen, daß es aus vielen weiten Röhren zusammen gesezt sey. q.

Die äusserste Haut (Epidermis) desselben, wovon ein Stückgen in natürlicher Grösse mit r. und vergrössert mit s. angezeigt ist, läßt die so wohl quer als senkrecht lauffende Gefäse, schon sehr merklich sehen. Indem die Pori (t) nichts anders als die querlauffenden u. aber die senkrechtstehenden Gefäse sind, welche die Figur F. noch besser vorstellet, wo v. den Zwerchschnitt in natürlicher w. aber in vermehrter Grösse angiebet.

Die zur Rinde auslauffende Gefäse, bemerkt der Buchstabe t. Die Eyrunden Löcher u. sind die Mündungen der senkrechten oder in die Höhe stehenden Saft und Luftröhren; und das Mark bezeichnet der Buchstabe x. welches aus blasenähnlichen Zellchen bestehet, die als Sechsecke zusammengeflochten sind, und durch das ganze übrige Holz sich erstrecken, welches alles durch eine stärkere Vergrösserung sich noch vollkommener zeigen wird, hier aber nur mit denen kleinen zwischen denen grossen Oefnungen u. zu sehenden runden Mündungen der Markröhrchen, angebracht werden können.

y. Ist die Epidermis von der innern Seite abgezeichnet, wo sie aus grünen Bläsgen und kleinen Zwischenröhrchen bestehet.

z. 1. z. 2. Sind Durchschnitte eines Knotens oder Absazes G, dergleichen an denen Ranken und neuen Schuffen des Rebenholzes häufig gefunden werden. Ich war begierig, ihren innern Bau zu wissen, und schnitte daher erstlich, einen davon, nach der Quere durch, wodurch ich belehrt wurde, daß das Mark auch zu beeden Seiten in die Knoten, Augen und Knospen sich erstrecke, eben so, wie aus dem Stamm eines grossen Baums in die Zweige, Aeste und Knospen: nach Figur z. 1. Weil aber dieser Querschnitt, mir keine vollkommene Genugthuung wegen der Seitenknospen verschaffte, welche ich mit einem Stern hier bezeichnet habe, indem das Mark nicht gleich aus, in denselben fortliefe,

Ce Fourreau devient peu à peu jaunâtre, brun & sec (m) & tombe finalement. Pour rendre ce que j'ai dit plus intelligible, j'ai représenté par

la fig. B. une Fleur à Fourreau verd, & par

la fig. C. une autre, le Fourreau brunâtre de laquelle & déja soulevé.

La Fig. D. montre encore une autre, dont le Fourreau & toutes les Parties Génitales sont tombées, &

la fig. E. fait voir le Nectaire avec ses 5. Anthêres, le tout observé & grossi par la Lentille, N. 6.

J'ai trouvé à la Grappe de Raisin fleurissante (b) quelques Oeufs de Papillons, qui luisoient comme la Nacre de Perle (n) et qui étoient à voir par le Microscope N. 6., comme les Lettres O et P. font connôitre. Ils étoient tous pourvus de Couvercles, & avoient le même Coloris que l'Arc en Ciel.

Si on observe le Bois seulement par une simple Lunette, on decouvre déja distinctement, qu'il est composé de beaucoup de Tuyaux larges (q).

L'Epiderme de ce Bois dont voici un petit morceau représenté par litt. (r) dans sa Grandeur naturelle, et par litt. (s) grossi, fait déja très distinctement voir tant les Vases qui passent obliquement que les Vases qui passent perpendiculairement. Parce que les Pores (t) ne sont autre chose que des Vases qui courent obliquement, (u) au contraire les Vases qui courent perpendiculairement, lesquels la fig. F. représente encore mieux, où (v) montre l'Eclat coupé à travers dans sa grandeur naturelle, mais (w) plus grossi.

La Lettre (t) marque les Vases, qui passent par l'Ecorce. Les Ouvertures ovales (u) sont les Orifices des Trachées & Tuyaux du Suc, qui courent perpendiculairement; & la Lettre (x) designe la Moëlle laquelle est composée de Cellules égales, qui s'entretiennent & sont hexagones & passent par tous les côtés du Bois, ce qui se fera voir parfaitement par un plus fort Microscope, n'ayant pu représenter ici que les petits ronds Orifices des Tuyaux de la Moëlle qui se trouvent parmi les grands Orifices (u).

y. Est l'Epiderme désigné de sa face intérieure, où il est composé de Vesicules verdes, et de petits Tuyaux.

z. 1. & z. 2. Sont des Coupures d'un Noeud (G), dont on trouve assès aux nouveaux jettons de la Vigne. J'etois fort curieux de savoir leur construction intérieure & j'en ai prémièrement coupé un à travers, par le moyen de quoi j'ai appris, que la Moëlle s'etend de même de deux côtès jusqu'aux Noeuds & Bourgeons, voyès la Fig. z. 1. Mais comme cette Coupure faite à travers ne me contentoit pas assès à cause des Rejettons, que j'ai marqué ici d'une étoile, parce que je ne voyois point que la Moëlle n'y alloit point en droiture, mais plutôt se separoit par des Vases droits; je fis une Coupure

per-

liefe, sondern durch gerad stehende Gefäse abgesondert sahe, so machte ich einen senkrechten Schnitt z. 2. und dadurch wurde ich erst belehrt, wo das Mark in denenselben seinen Zugang genommen, nehmlich nicht oben bey ⊙. sondern besser unten wo ☾. solches anzeigt.

Ich überlasse übrigens gar gerne andern, ein mehrers an diesem Gewächs zu entdecken.

Ich habe mir vorgesezt, nur das was das Mikroskop angehet, bekannt zu machen, gelährten Pflanzenbeschreibern aber, anheimzustellen, was zur Geschichte des Weinstocks gehört. Der berühmte Herr Verfasser des Hamburgischen Magazins, sagt sehr gründlich in einem Vorbericht zu diesen Buch: Zur Naturgeschichte gehören zweyerley Personen: Einige die beobachten, und wieder andere, welche diese Beobachtungen oder Erfahrungen prüfen und allgemein nuzlich machen.

Ich will dieses überhaubts zu meiner Rechtfertigung anmerken, wann vielleicht von mir mehr gefordert werden wollte, als zu der Einrichtung dieser Blätter bestimmt worden ist.

perpendiculaire z. 2, & j'appris par-là alors, par où la Moëlle y passoit, savoir pas en haut Fig. ⊙, mais plus bas comme la Fig. ☽. le montre.

Je me contente de ce que j'en ai dit, et abandonne le reste de Découvertes à cette Plante à Messieurs les Botanistes.

Je me suis proposé d'en dire seulement, ce qui regarde le Microscope. Je laisse aux Savans qui nous donnent des Descriptions de Plantes, ce qui regarde l'Histoire de la Vigne. Le celebre Auteur du Magazin d'Hambourg, dit très bien dans la Préface de ce Livre: qu'il faut deux sortes de Persones pour la Physique. Quelques uns qui observent & suivent la Nature; & d'autres qui examinent ces Observations ou Expériences & les redent plus avantageuses.

Je veux remarquer cela généralement pour ma défense, en cas que quelqu'un exigeroit plus de moi que la Disposition de ces Feuilles demande.

TABULA VIII.

Die blaue Schwertlilie, mit dem rothen kleinen Lilienkäfer.

So anmuthig diese schöne Blume in denen Gärten pranget, so sehr verdient sie die nähere Betrachtung eines aufmerksamen Freundes der Naturkunde.

Sie hat etwas besonders in ihrer Einrichtung, welche sehr wenige Blumen mit ihr gemein haben, und ihre Befruchtungstheile, werden wohl nicht allen Gartenliebhabern bekannt seyn. Ich habe sie daher für werth geachtet, denen Gönnern reizender Blumen, zergliedert vorgelegt zu werden, und ich schmeichle mir vorläufig, daß meine Bemühung nicht ganz ohne Nuzen seyn werde.

Anfänglich liegt sie in einem Knopf oder in einer Knospe, welche mit einer gedoppelten Decke überzogen ist. Ich muß es denen Herren Botanisten anheimstellen, welche Decke hier für den wahren Kelch erklärt werden darf. Denn die Knospe hat 5. grüne, zarte, Schifförmige Deckblätter. Eines davon A. schließt anfänglich die andern 4. sammt der Knospe B. ein. Nach meinem Begriff könnten die obersten 2. Blätter C. C. am ersten für den Kelch genommen werden; weil sie beständig den Fuß der Corolle und den Eyerstock umschliessen und verwahren. Diese sind zu oberst sehr zart, verliehren ihre grüne Farben, und werden fahl, wie feines Chinesisches Papier

TABLE VIII.

Le Glayeul bleu, avec le petit Hanneton rouge de Lis.

Autant que la Fleur du Glayeul est jolie dans les Jardins, autant merite t-elle d'être observée de plus près d'un Amateur de la Physique.

Elle a quelque chose de singulier dans sa Construction intérieure, qui ne se trouve ordinairement qu'en fort peu de Fleurs, & je crois qu'un petit Nombre des Amateurs de Fleurs connôitra ses Parties Genitales. C'est pourquoi je les croyois dignes d'être presentées disséquées aux Amateurs, & je me flatte que ce travail sera de quelque utilité.

D'abord elle est couchée dans un Bouton ou Bourgeon, qui est garni d'une double Couverture. Je laisse à decider Messrs. les Botanistes & Physiciens, laquelle de ces Couvertures on doit prendre pour la veritable Coupe. Car un tel Bourgeon a 5. tendres Feuilles verdes en forme de bateau. Un de ceux A. enveloppe au commencement les 4. autres avec le Bourgeon B. Selon moi on pourroit plutôt prendre pour la Coupe les deux derniéres Feuilles C. C; parce qu'elles entourent & gardent continuellement le pied de la Corolle & l'Ovaire. Elles sont tout en haut très tendres, perdent

leur

Papier ſo von Seide gemacht zu werden pflegt. Aus dieſen erhebt ſich dann die Blume und läßt das erſte Deckblat A. tiefer unten, alleine zurücke, wie auch das erſte Paar grüne Decken D D. das andere Paar aber, umgiebt, wie gedacht, den Uterum E. Dieſer iſt nichts anders als eine Fortſetzung und Verbindung der Blätter der Corolle. Ein jedes petalum oder Corollen-Blat derſelben, gehet ohne einen Abſatz oder Abſchnitt zu zeigen, gerad hinunter zu den Eyerſtock, daher auch dieſer ſchon von auſſen eben ſo viele Theile ſehen läſſet, als Petala auf denſelben ſtehen, nehmlich ſechs; wie die Figur F. erklärt.

leur Couleur verde, & deviennent jaunes comme ce Papier fin de la Chine, qu'on fait de Soye. De ces Feuilles vient la Fleur, et elle laiſſe en arriére la prémiere Feuille de la Couverture (A) tout ſeule plus bas, comme auſſi la premiére couple de Couvertures verdes D D. l'autre couple de Couvertures au contraire entoure, comme j'ai dit ci-deſſùs l'Uterus ou la Matrice E. Celui-ci n'eſt autre choſe qu'une Continuation & Liaiſon des Feuilles de la Corolle: chaque de ſes Pétales ou Feuilles deſcende, ſans marquer un Noeud ou une Coupûre, tout droit à l'Ovaire, de là vient que celui-ci fait deja voir en dehors autant de Parties qu'il a de Petales, c'eſt-à-dire ſix, comme cela montre la Fig. F.

Auf dieſen Eyerſtock ſiehet man dann die Blume, welche nun ebenfalls einen beſondern, unvollkommenen und zertheilten Piſtill hat, weil das Stigma anderswo ſich befindet. Der Uterus E. iſt zwar zu ſehen, wie auch etwas das man einen Griffel oder Stiel nenen kan, (G.) welches aber nichts anders iſt, als die Zuſammenfügung der Blätter-Corolle, ſo ſich immer mehr aufwärts ſpaltet und zertheilet.

On voit alors la Fleur ſur cet Ovaire, laquelle a de même un Piſtil particulier, imparfait & diviſé, parceque le Stigme ſe trouve ailleurs. L'Uterus E. ſe fait pourtant voir, comme auſſi quelque choſe que l'on pourroit nommer une Aiguille ou Queüe G. qui n'eſt cependant autre choſe que la Combinaiſon de la Corolle, qui s'ouvre & ſe diviſe de plus en plus en haut.

Sucht man hingegen die Wärzgen oder das Stigma, ſo muß man ſich nach denſelben auf denen blauen Blättern der Corolle umſehen, und man wird ſie endlich deutlich finden und entdecken, wenn man den goldgelben Pelz auf denen 3. Blättern Nummer 1. 2. 3. durch gute Vergröſſerungsgläſer anſiehet. Dieſer Pelz H. ſiehet durch Nr. 6. ſo, wie Fig. I. darſtellet, und durch ſtärkere Vergröſſerungen als K. Die gelbe Faſern mit ihren braunrothen Wärzgen, ſind die wahren Griffels mit ihren Narben; und dieſes erläutert und bezeugt noch deutlicher die Laage der Antheren oder Staubträger, welche gleichſam in Nitſchen oder Gehäuſen verwahrt, über dieſen Griffeln ſtehen L. und dieſe Bedeckung findet man deutlich an den 3. braungelben gebogenen Blättern 4. 5. 6. Darinn eines von innen mit ſeinen Staubträger die Figur M. zeigt.

Mais ſi on veut trouver les Verrües ou le Stigme, il faut le chercher ſur les Feuilles bleues de la Corolle, où on les decouvrira à la fin diſtinctement, ſi on regarde par un bon Microſcope la Fourrure couleur d'or ſur ces 3. Feuilles N. 1. 2. 3. Cette Fourrure H. a la mine, en la régardant par la Lentille N. 6., comme la Fig. I. montre, & elle eſt faite comme Fig. K. quand l'on obſerve par un plus fort Microſcope. Les Fibres jaunes avec leurs Verrües rouſſâtres ſont les veritables Aiguilles avec leurs Cicatrices; & la Poſition des Anthéres éclaircit & prouve cela encore plus diſtinctement, leſquels, étant quaſi gardés dans des Etuis, ſont plantés au deſſus de ces Aiguilles (L.) et l'on trouve cette Couverture fort diſtinctement à ces 3. Feuilles brunâtres courbées 4. 5. 6. dont la Fig. M. en montre une de dédans avec ſon Anthére.

Ferners iſt dieſe Blume noch mit 3. ſehr zarten Blättern geziert, welche ordentlich in der Höhe aufgerichtet ſtehen, und gleichſam zur mehrern Verwahrung der Befruchtungstheile dienen, indem ſie ſich insgeſammt oben zuſammenſchlieſſen, wie ich bey der Figur 2. ſie abgezeichnet, bey Figur 1. aber heruntergebogen habe. Nimmt man nun die Blätter 1. 2. 3. und 7. 8. 9. hinweg, ſo bleiben die 3. Nitſchen oder vertieften Schifförmigen Blätter, welche die Staubträger bedecken, alleine in der Mitte ſtehen. Figur 3; und dann ſiehet man die 3. ſchneeweiſſen Antheren, vollkommen, welche dieſe Blume befruchten.

Cette Fleur eſt encore ornée de 3. Feuilles fort tendres, qui ſont ordinairement dreſſées en haut, & ſervent quaſi à garder d'autant plus les Parties Genitâles, par ce qu'elles ſe ſerrent toutes en haut, comme je les ai deſigné à la Fig. 2. & à la Fig. 1. au contraire les ai repreſenté courbées. Si on ôte les Feuilles de 1. 2. 3. & 7. 8. 9. alors reſtent les Etuis en forme de Bateaux plus enfoncés, qui couvrent les Anthéres, ſeuls au milieu Fig. 3. & on voit alors parfaitement les 3. Anthéres blancs, qui rendent cette Fleur fertile.

Einen davon zeigt durch Nr. 6. vergröſſert die Figur N. mit ſeinen 2. gedoppelten Staubbeuteln. Den Antherenſtaub aber in natürlicher Gröſſe der Buchſtabe O. und im Waſſer durch Nr. 0. beobachtet. P. welcher ebenfals weiß und Gerſtenförmig iſt.

La Fig. N. en fait voir un de ces Anthéres groſſi par la Lentille N. 6. avec ſes doubles Bourſes. Mais la Lettre O. préſente la Poudre Anthérique dans ſa grandeur naturelle, & P. lorsqu'elle eſt dans l'eau, obſervée par N. O. ou elle eſt de même blanche & en forme d'Orge.

Herr Dr. Hill mag von seinen neuen System und Antherenkeimigen schreiben was ihm nur gut befindet, ich habe weder in den Staub der Lilien noch der Amaryllis dergleichen Keimigen gesehen, noch biß diese Stunde entdecken können; welches bey dieser Gelegenheit mitanzumerken für meine Schuldigkeit erachtet habe, und wovon in dem 43sten Stuck der Fränkischen Sammlungen sich eine besondere und ausführliche Untersuchung von mir befindet.

Que Mr. le Docteur Hill dise tout ce qu'il veut de son nouveau Systeme & de ses petits Germes d'Anthêres, je n'en ai vu ni pû decouvrir jusqu'à ce moment aucun de ces petits Germes ni dans la Poudre de Lis ni dans l'Amaryllis. C'est ce que j'ai jugé à propos d'observer ici. Il se trouve une Observation de moi, sur cette Matiere, (qui est plus achevée) dans la 43. Partie des Fraënkischen Sammlungen.

Wie aber der Antheren Saft zu den Wachsthum der Embryonen geleitet wird, soll die Figur Q. zu erkennen geben. Der Eyerstock hat 3. gedoppelte Fächer und also 6. Zellen. Auf einem jedem Fach, stehet ein Blat mit Griffeln, dieses leitet den Saft in die 2. Fächer R, so hier in natürlicher Grösse nach der Länge oder senkrecht getheilt, angezeigt sind, S. aber etwas vergrössert und nach der Quere durchschnitten, mit einigen umliegenden Embryonen bemerket.

La Fig. Q. montrera comme le Suc antherique est conduit pour faire crôitre les Embrions. L'Ovaire a 3. Cassetins doubles & par conséquent 6. Cellules. Sur chaque Cassetin se trouve une Feuille à Aiguilles, celle-ci conduit le Suc dans les 2. Cassetins R. que j'ai représenté ici perpendiculairement coupés, dans leur grandeur naturelle, mais lesquels j'ai observé par litt. S. plus grossi, & coupés au travers avec quelques Embrions y enfermés.

Und diese Figur R. wird also noch mehr bestättigen, daß die gelben Haare H. auf den 3. Blättern 1. 2. 3. die wahren Griffels dieser Blume sind.

Et cette Fig. R. prouvera encore plus que les Cheveux jaunes de la Peau (H) sur les 3. Feuilles. 1. 2. 3. sont les veritables Aiguilles de cette Fleur.

Die Figur T. stellet endlich noch ein Blat, von den untern breiten grünen Blättern vor, welche zu erst hervorkommen, und wegen ihrer Gestalt, der Blume den Namen der Schwertlilie verschaft haben. Das darauf befindliche Käferlein, U. nebst der Puppe Z. so man gar oft auf diesen Blättern siehet, lässet sich auf allen Arten der Lilien finden. Man siehet mehrentheils dieses kleine Insekt gepaart aufeinander; und so man es an das Ohr hält, so hört man einen singenden Schall, welches vermuthlich von dem aneinander reiben seiner ringförmigen Einschnitte am Leib, entstehet. Das Männgen sizt oft zu halben Tägen auf dem Weibgen, welches deme ohngehindert ihre Eyer ablegt, und mit dem Männgen fortwandelt.

La Figure T. représente finalement encore une de ces Feuilles larges & verdes d'en bas, qui sortent le prémier, & qui ont donné à cette Fleur le Nom de Glayeul à cause de leur Forme d'epée. Le petit Escarbot rouge U. qui y est, avec la Poupée Z. se trouve sur toutes sortes de Lis. On voit ordinairement de ce petit Insecte deux à deux accouplés; & si on approche cet Insecte de l'oreille, alors on entend un resonnement lequel vient problablement du frottement de ses Coupûres circulaires au Corps. Le Mâle se tient dé demi-journées sur la Femelle, ce qui n'empeche pourtant pas qu'elle ne bonde point, & ne marche avec sa Charge tout par tout.

a. Sind einige Eyer in natürlcher Grösse, b. aber eines davon vergrössert. Der schwarze Punkt bemerkt den Kopf, der durchscheinet, und schon in der Mutter schwarz ist. c. Sind ausgeschloffene Räupgen, oder Käferwürmer wie sie nach und nach zunehmen und grösser werden, biß sie endlich ihre Vollkommenheiten wie d. zeigt, erhalten haben.

Vous voyez litt. a. quelques Oeufs de cet Escarbot dans leur grandeur naturelle. b. au contraire en montre un grossi; le Point noir marque la Tête, qui luit au travers, & qui est déja noire dans la Matrice. La Lettre C. nous présente quelques Chenilles ou Vers sortis du Cocon, comme elles grandissent petit à petit, jusqu'à ce qu'elles sont parvenües à leur Perfection comme d. montre.

Unter dem Fressen, lassen sie den Auswurf der Nahrung dergestalt von sich, daß sie ihren Rucken ganz damit bedecken, und sich theils von der Sonnenhize damit bedecken, theils vor ihren Feinden dadurch sich zu verbergen suchen. Dieser Auswurf ist äusserlich schwarz, wie Erde; duch das Vergrösserungsglas aber zerhacktes grünes Gras, oder die kleinsten Theilgen der abgenagten Blätter. Sie sind kaum eine Stunde auf dem Blat ausgeschloffen, so fangen sie schon an sich also zu bedecken, S. Fig. c. d. Endlich bleiben sie ruhig liegen und werden zur Puppe e., welche unter ihrer schwarzgrünen Kothdecke f. so lange verborgen bleibt, biß der Käfer U. endlich wieder hervorkommt. Dieses geschieht des Jahrs 2mal; im Frühjahr und im Herbst; was im Spathjahr zur Puppe wird, bleibt

Elles se défont, en mangeant, des Ordures de la Nourriture de cette manière, qu'elles en couvrent totalement leur dos, & cherchent à se mettre par-là à l'abri du Soleil & à se cacher de leurs ennemis. Ces excrements sont noires comme Terre par déhors; mais lorsqu'on les régarde par le Microscope, ce n'est que l'herbe verde bien hachée, ou les plus petites Particules des Feuilles qu'elles ont rongé. S'il n'est qu'une heure qu'elles sont sorties du Cocon sur la Feuille, néanmoins elles commencent déja à se couvrir ainsi, voyès les Fig. C. D. Elles restent à la fin tranquilles, & deviennent en Poupée. e. laquelle demeure tant sous sa Couverture d'excrements, iusqu'à ce que l'Escarbot u. en renait. Cela se fait deux fois par an;

TAB. VIII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

M.F.L. del.

A.L.W. Sc.

bleibt den Winter durch, in der Erde liegen, und kommt sogleich im Monath Merz schon, wann es warme Tage hat, aus der Erde als Käfer hervor. Alles ist roth an diesen Geschöpfen, auch die Säfte im Ey, in der Puppe und im Käfer; so im Mikroskop eine ungemein lebhafte Farbe zeigen. Dieser Käfer ist einer von den ersten Bothen des Frühlings. Die Begattung geschieht wie bey grossen vierfüßigen Thieren, indem das Männgen das Weibgen besteigt; Der Kopf, die Augen und der Bauch, sind schwarz. Die 2. Oberflügel und das Kragenstuck roth, die 2. Unterflügel wie an andern Käfern, und auf der Brust sizen 6. Füsse. Am Kopfe hat es 2. lange und 2. kurze Antennen, und ein sehr scharf schneidendes Sichelförmiges Zangengebis.

an; au Printems & à l'Automne; ce qui devient dans l'Automne en Poupée, reste durant l'hiver dans la Terre, & sort déjà Escarbot au Mois de Mars s'il fait chaud. Tout est rouge en ces Créatures, même les Sucs dans l'Oeuf, dans la Poupée & dans l'Escarbot, & cela est fort beau à voir par le Microscope. Cet Escarbot est l'Avantcoureur du Printems. l'Accouplement se fait dans cette Espèce comme parmi les autres Animaux quadrupédes, le Mâle monte sur la Femelle. La Tête, les Yeux & le Ventre sont noirs. Les 2. Ailes supérieures & le Cou sont rouges, & les 2. Ailes du dessous comme aux autres Escarbots; & cet Animal a sur la Poitrine six Pieds. Il a deux longues & deux courtes Antennes à la Tête; & au lieu de dens deux Tenailles fort aiguës, tranchantes & courbes, en forme de Fauciles.

TABULA IX.

Eine nähere Vorstellung der Befruchtungstheile an den Rosen, samt der Abbildung eines besondern Puceronfressers.

Es ist mir bey meinem leztern Aufenthalt in Bonnland, von Tit. Plen. dem Herrn geheimen Rath von Gleichen, der Einwurf gemacht worden, daß die Griffel der Rosen nicht auf einen Büschel dergestalt enge beysammen stünden, wie ich solche auf der 77. und 80sten Tafel meiner Mikroskopischen Gemüths und Augen-Ergözung abgebildet hätte, sondern sie wären von einander gesondert.

Ob ich nun gleich versichern kan, daß ich sie in vielen Rosen sehr dichte beysammen gesehen, so habe ich doch nicht unterlassen wollen, diesen Vorwurf aus dem Weg zu räumen und den Kelch der Rose, auch mit abgesonderten Griffeln, abzuschildern.

Sollte der g. L. etwa verdrüßlich darüber werden, auch in diesem Werk eine Rose zu sehen, so wird verhoffentlich die beygefügte kleine Geschichte einer grausamen Raupe oder Made, diesen Unwillen wieder besänftigen. Ehe ich sie aber erzähle, will ich zuvor die Figuren von der Rose beschreiben.

Fig. 1. Ist ein kleiner Rosenzweig, mit einem geschlossenen (a) und halb offenen Knopf (b) dann einer blühenden Rosenblume (c).

Fig. 2. Bemerkt den Kelch, mit seinen 68. Staubträgern.

Fig. 3. Einen andern mit denen 24. Griffeln alleine und

TABLE IX.

Répréſentation plus préciſe des Parties Génitâles aux Roſes, avec la Déſcription d'un ſingulier Mangeur de Pucerons.

Monsieur le Conseiller intime de Gleichen m'a objecté durant mon dennier sejour à Bonnland, que les Aiguilles des Roses ne se trouvoient pas ensemble sur un Tas, comme je les avois représenté sur la Table de mes Amusements Microscopiques de l'Esprit et des Yeux; Voy: la Table LXXVII & LXXX. mais qu'elles étoient separées.

Quoique je puis assurer de les avoir vu fort serrées ensemble dans plusieures Roses, neanmoins je ne voulois pas manquer de me débarrasser de ce réproche, et de représenter la Coupe de la Rose même à Aiguilles séparées.

Si quelqu'un seroit faché de trouver la Déscription de la Rose répetée dans cet Ouvrage, l'histoire d'une Chenille sanguinaire, que l'on y a joint, pourroit peut-être le radoucir. Mais, avant que d'en commencer le recit, je m'en vais auparavant expliquer les Figures de la Rose.

Fig. 1. est. une petite Branche de la Rose, avec un Bouton fermé a. & un autre à moitié ouvert b. & une Rose en fleur.

la Fig. 2. marque la Coupe, avec ses Anthéres au nombre de 68.

la Fig. 3. présente une autre seulement avec ses 24. Aiguilles, &

Fig. 4. Einen leeren Kelch ohne Griffel und Antheren.

Fig. 5. Gibt den Eyerstock a. zu erkennen, nebst dem Stiel und denen 5. Kelchblättern. b.

Fig. 6. Ist ein etwas vergrösserter Griffel deren wie gedacht 24. sind, und

Fig. 7. Ein Staubträger nebst seinen Antheren von denen 68. biß 70. in der Rose gefunden werden.

Das übrige, besonders das Ovarium und die rothen Kugeln auf denen Dornen oder Stacheln der Rose, welche endlich sich in die feinste Spize ausdehnen und verwandeln, habe ich, in meinen Mikroskopischen Ergözungen, samt der Frucht, verhoffentlich zur Genüge, vorgestellt und beschrieben.

Ich schliesse daher die Beschreibung dieser Tafel mit der Abbildung eines besondern Insects, einer Raupe, oder Made, welche man mit Recht den Puceronfresser oder Sauger nennen kan.

Sie siehet an Farbe weißgrün, und wann sie ihre vollkommene Grösse erreicht hat, so siehet sie natürlich, wie sie die Figur d. darstellet. Sie hat sehr viele Ringe oder Einschnitte an ihrem Leibe.

Keine Hackenfüsse, sondern lauter platte Stumpfen; zu hinterst aber, an der Schwanz-Klappe, zwey breite Brazen, womit sie sich vest an etwas kleben und lange mit ihrem Raub, in freyer Luft, sich also aufhalten kan.

Auf die grünen Blatläuse oder Pucerons ist sie ungemein begierig, ja unersättlich. Die Langsamkeit dieser trägen Geschöpfe, giebt ihrem Feind Gelegenheit, seine Beute mit der grösten Bequemlichkeit zu holen, und zu verzehren.

Ich habe mit Verwunderung beobachtet, daß 8. biß 10. Pucerons vor seinem Kopf ganz ruhig und unbeweglich sassen, während der Zeit, als er einen von ihnen erwürgte. War er mit diesem fertig, so streckte er ganz gemächlich nur seinen Kopf etwas weiter hervor, und nahm den andern und so den dritten und vierdten, biß er sie insgesammt ausgesaugt hatte.

Denn dieses Insekt frißt nicht, sondern saugt nur allen Saft aus dem Leib eines Pucerons, und man kan mit einem Nr. 5. schon deutlich das Saug-Instrument sehen, welches dieser Wurm gebraucht, den ich ehender für eine Made als für eine Raupe halte, weil ihm die Hackenfüsse fehlen, die als ein wahres Kennzeichen einer Raupe betrachtet werden können.

Sein ganzer Leib hat zu beeden Seiten zarte Haare, gleich Stacheln oder Dornen. Fig. e. wird solchen durch das Suchglas vergrössert, sehend machen; wo e. das Aestgen ist, woran sich der Wurm f. mit der Schwanzklappe g. anstemmte und den grünen Pucceron h. in freyer Luft aussaugte.

Ich habe eine gewisse Art der Grausamkeit dabey bemerkt; denn wann sich der Puceron nur regte, so schüttelte er denselben sehr heftig herum, gleich einer Kaz, wann sie eine Mauus erwürgt, und was mich noch in grössere Verwunderung sezte, war die Stärke und Gewalt, welche dieser kleine Maden oder auch Raupenwurm leediglich mit seinem Kopf, mit

la Fig. 4. une Coupe vuide sans Aiguilles & Anthêres.

la Fig. 5. fait voir l'Ovaire a., avec la Queüe & les 5. Pétales. b.

Fig. 6. est une Aiguille un peu grossie, dont la Rose a 24. &

Fig. 7. est un Porteur de l'Anthêra avec ses Anthêres, desquels on trouve 68. à 70. dans la Rose.

Pour ce qui regarde le reste, & particulairement l'Ovaire & ces Globules rouges sur les epines de la Rose, qui changent & aboutissent en pointe, avec le Fruit, je l'ai assès expliqué, à ce que je crois, dans mes Amusements Microscopiques.

Je m'en vais donc finir l'Explication de cette Table par la Description d'une Chenille, que l'on peut nommer avec raison, le Mangeur de Pucerons.

Il tire du blanc sur le verd, & lorsqu'il est parvenu à sa parfaite grandeur, il a la mine tout comme la Fig. d. le montre. SonCorps est composé de beaucoup de Cercles ou Coupures.

Il n'est pas pourvu de Crochets au Pieds, mais il a seulement de Moignons; mais il a à la croupiére deux Pattes larges, moyennant lesquelles il peut s'attacher & se tenir fort long tems en l'air avec sa Proye.

Il est fort acharné contre les Pucerons, même insatiable. Et la Paresse de ces Creatures lentes, sert à leur ennemi d'aller chercher & manger sa Proye, très commodement.

J'étois etonné de voir rester tranquillement 8. à 10. Pucerons devant la Tête de la Chenille dans le tems qu'il en étrangloit un d'eux. Aussitôt qu'elle avoit succé le prémier, elle étendoit doucement sa tête, prit le deuxime, troisiéme etc. iusqu'à ce qu'elle les ait succé tous.

Car cet Insecte ne mange point, mais succe seulement tous les Sucs du Corps d'un Punceron, & on peut déja distinctement voir par la Lentille N. 5. l'Instrument à succer, dont se sert ce Ver que j'aurois plutôt pris pour un Ver que pour une Chenille, parce qu'il n'a point de pieds à croc, ce qui est une veritable Marque d'une Chenille.

Son Corps est garni de Cheveux fins de deux côtés, tout comme d'epines. La Fig. e. nous le fera voir grossi par la Lentille, ou e. marque la Branche à laquelle le Ver f. se tenoit avec la Queuë g. & y succoit le Puceron verd en l'air.

J'ai trouvé en ce Ver une Espéce de Cruauté; Car aussitôt que le Puceron faisoit le moindre mouvement, la Chenille le sécouoit terriblement, tout comme un Chat quand il étrangle une Souris, & ce qui m'étonnoit encore plus étoit la Force de la Tête de cette Chenille. Car elle n'em-

TAB. IX.

Fig. 1.



M.F.L. del. *A.L.W. Sc.*

mir sehen liesse. Denn er brauchte weder Füsse noch sonst einen Theil seines Leibs, sondern leediglich sei seinen Mund und die darinn befindliche Saugmaschine, welche man gar deutlich an der kleinen runden Oefnung des Mundes biß zur Helfte des Kopfs, vor und hinter sich gehend sahe.

Zum Glück, sind beede Insekten, die Made und die Blatlauß, sehr durchscheinend, und daher kan man gar deutlich sehen, wie sich die Säfte in der ersten einziehen und vermehren, in der andern aber ausgehen und sich verliehren, von welcher endlich nichts übrig bleibt, als der leere zusamngeschrumpfte Balg, den der Mörder endlich wegschleudert.

Den Angrif macht der Vielfraß gemeiniglich unter dem Kopf, am Halß, wie ich hier ebenfalls vorgestellet habe; und wann er etliche Minuten da gesaugt hat, so entstehet sogleich ein weißgelber Flecken, und darauf erfolgt der Tod des Pucerons.

Wer gern Sinnbilder sammlet, kan hier eine Veränderung zu jenen bekannten Sprichwort finden: Minor esca majoris, oder nach dem vortreflichen Herrn von Hagedorn:

Wer nicht die Gab hat sich zu wehren,

Der laß gedultig sich verzehren.

Nota. Dieweilen ich jezo mit ungleich bessern Vergrösserung-Werkzeuchen versehen bin, als damalen, da ich in meinen Mikr. Gem. und Augen Ergözungen die Pucerons abgebildet habe, so behalte ich mir bevor ehestens noch eine bessere Zeichnung und und nähere Abbildung dieser Geschöpfe mit anfügen zu dörfen.

n'employe pas ses jambes ou quelque autre Partie de son Corps, mais seulement sa Bouche & la Machine à succer qui y est, laquelle on voit distinctement promener, depuis la Gueule iusq'à la moitié de la Tête.

Il y a du bonheur que ces deux Insectes, la Chenille & le Puceron, sont très transparents, & c'est ce qui fait qu'on peut voir distinctement, comme les Sucs entrent & s'augmentent dans la Chenille, mais au contraire sortent & se diminuent dans le Puceron, duquel ne reste à la fin que la Peau ridée, laquelle la Chenille jette en bas.

Cet Animal gourmand attaque ordinairement le Puceron au col sous la Tête, comme j'ai montré ici; & lorsqu'il y a succé quelques Minutes, il s'y montre une Tache jaunâtre, où s'en suit la Mort du Puceron.

Ceux qui aiment à ramasser des Emblèmes ou Dévises trouvent de quoi changer le Proverbe connû:

Minor esca Majoris; le Foible est mangé du Fort:
Ou comme chantoit Mr. de Hagendorn,
Qui n'a point la force pour se defendre,
Ne sauroit faire autre chose que de se laisser
Absorber tranquillement.

Avis. Comme j'ai actuellement de meilleues Microscopes que je n'avois dans le tems que j'ai décrit les Pucerons dans mes Amusemens Microscopiques, je me reserve d'en donner une meilleure Description, & de les dessiner avec plus d'exactitude dans ces Feuilles.

TABULA X. & XI.

Die Kirsche mit ihrer Blüht und Frucht, samt der Bildung des Kerns.

Verdienet irgend eine Beobachtung im Pflanzenreich unsere Aufmerksamkeit, so ist es das Wachsthum oder die Bildung der Frucht und ihres Saamens. Ich habe mir daher vorgenommen, diese Untersuchung erstlich an den Kirschen zu machen, zumalen dasjenige was ich biß daher davon gelesen, und in Abschilderungen gesehen habe, mir kein vollkommenes Genügen leisten wollen.

Denn so mühsam und sorgfältig auch der unsterbliche Freyherr von Wolf, den Kern der Kirschen, durch verschiedene Vergrösserungen, betrachtete, und sich hiezu der Schriften und Anleitung eines Grew, und Malpighs bediente, so wird man jedoch aus dem Innhalt seiner Beschreibung, klar ersehen, daß derselbe

TABLE X. & XI.

La Cerise, sa Fleur & son Fruit, avec la Formation du Pepin.

S'il y a une Observation dans le Regne des Plantes digne de notre attention, c'est surement la Végétation ou la Formation du Fruit & de la Semence. C'est aussi ce qui m'a porté d'examiner la Cerise d'autant plus que tout ce, que j'en ai lû, & que toutes les Représentations que j'en ai vu n'ont pû me satisfaire jusqu'à ce Moment.

Car quoique l'immortel Mr. le Baron de Wolf ait observé le Pepin des Cerises avec tant de peine & exactitude par de differents Microscopes, & quoiqu'il se soit servi de l'instruction, & des Ouvrages d'un Grew & Malpigh, on verra néanmoins très distinctement du contenu de sa

selbe dem Liebhaber noch vieles nachzusuchen hinterlassen habe. *

Eben so sind auch die Abbildungen beschaffen, welche uns der berühmte Naturforscher, Herr du Hamel, in seiner Naturgeschichte der Bäume, von der Bildung der Steinkerne, mittheilen wollen, weswegen ich die g. L. bitte, die Kupfertafeln dieses sehr schönen Werks, selbsten zu betrachten. **

Es sey ferne von mir, daß ich dieser über mein Urtheil so weit erhabner Gelährten Schriften, nur im mindesten tadeln wollte. Ich kenne ihren grossen Werth: Ich hoffe aber auch, ein jeder unpartheyischer Leser, werde nach Gegeneinanderhaltung meiner Beobachtungen mit jenen Schriften, mir beypflichten, wann ich sage, daß solche uns da verlassen, wo wir den Unterricht am nöthigsten haben, und daß sie uns gerade das nicht sehen lassen, was wir doch gerne entdecken möchten.

Von dem Unterschied der Abbildungen, hier nichts zu gedenken, als welchen ein jeder aufrichtiger Kenner, leicht von selbsten abnehmen wird.

Ich meines Orts, habe mich bey diesen Erfahrungen, leediglich meiner eigenen Art zu beobachten, ohne alle fremde Anleitung, bedient, und ich bringe also nichts zu Pappier, als was mir die Natur selbst in die Feder und auf den Pensel gelegt, oder was ich gesehen und entdeckt habe.

Dieses ist es, was ich denn auch meinen g. L. ohne allen entlehnten Schmuck aus grossen Werken, mittheile, und zu deren eigenen und nähern Prüfung und Untersuchung, überlasse und empfehle.

Derjenige, der eine Frucht genau beschreiben will, wird zuvor ihren ersten Urstoff nachgehen, folglich sich zuerst nach der Blühte umsehen müssen, in welcher die Erzeugung und Bildung der Frucht und des Saamens, vorgehet.

An der Kirsche bestehet sie aus einer Blume, in welcher beede Geschlechte beysammen wohnen. Ihre Corolle hat 5. Petale oder weisse Blätter. Diese stehen auf einem Kelch der ebenfalls 5. grüne Blätterförmige Kronenspitzen hat, und das Fruchtbehältnus zu gleicher Zeit abgibt.

Nimmt man die 5. weissen Blätter ab, so siehet man eine Grubenförmige Vertiefung, in welcher der Embryo liegt; auf demselben aber stehet der grüngelbe lange Griffel, mit seinem Wärzgen, und um dieses Grübgen herum, sind 30. Staubträger mit goldgelben doppelten Staubbeuteln, aufgepflanzt.

Die

* Herrn Christian von Wolfs allerhand nutzliche Versuche, dadurch zu genauer Erkänntnus der Natur und Kunst der Weg gebahnet wird. 3ter Theil. Halle 1723. §. 93. Seite 385.

** Du Hamel Naturgeschichte der Bäume. Theil 1. Buch 3. Cap. 2. Tab. IX. Fig. 259. ꝛc.

Description, qu'il avoit laissé aux Amateurs encore beaucoup à rechercher. *

Les Representations de la formation des Noyaux de cet incomparable Physicien Mr. *du Hamel* dans son Histoire naturelle des Arbres sont de meme aloy, c'est pourquoi je supplie mes Lecteurs de vouloir bien examiner eux mêmes les Planches de ce bel Ouvrage. **

Loin de vouloir critiquer les Ouvrages des Savants au dessûs de moi, connoissant bien leur prix; j'espere pourtant que chaque Lecteur desintereſſé sera de mon Coté, apres avoir confronté mes Observations avec les Esquisses de ces Savans, lorsque j'avance qu'ils nous ont justement abandonné là, où nous avons plus besoin de leur sécours, & qu'ils nous ont pas fait voir ce que nous souhaitions pourtant fort à découvrir.

Je ne parlerai non plus de la Difference des Figures que chaque Connoisseur impartial verra de soi même.

Quant à moi je me suis servi dans ces Experiences, de ma façon particuliére d'observer, sans avoir emprunté la moindre chose de qui que ce soit, & par conséquent je ne dis que ce que la Nature même m'a dicté ou ce que j'ai vu & découvert.

C'est aussi ce que je présente à mes Lecteurs, sans m'avoir paré du bien d'autrui, & c'est ce que je leur recommande d'examiner eux memes de plus près.

Celui qui veut décrire un Fruit exactement, doit avant toutes choses chercher sa prémière Matière ou Origine, & il doit par conséquent rechercher la Fleur, dans laquelle la Génération & Formation de la Semence se fait.

La Cerise n'a qu'une seule Fleur, dans laquelle les deux Sexes se trouvent ensemble. Sa Corolle a 5. Petales ou Feuilles blanches. Ils sont plantés sur une Coupe qui a de même 5. Feuilles verdes fort pointües, & qui servent en même tems de Garde-Fruit.

Si on ôte les 5. Feuilles blanches, on voit alors une Cavité dans laquelle l'Embrion est couché, mais au dessus duquel se trouve l'Aiguille longue verde & jaunâtre avec sa Verrue, & autour de cette fosse sont plantés les 30. Anthêres à doubles Bourses de la Poudre couleur d'or.

La

* Voyès Chrétien de Wolf. Recueil de Differents Essais utiles, par lesquels on obtient une Connoissance plus exacte de la Nature & de l'Art. Tome III. à Halle 1723. paragr. 93. page 385.

** Voyès l'Histoire Naturelle des Arbres de Mr. du Hamel. Partie 1. Livre 3. Chapitre 2. Table IX. Fig. 259.

Der Befruchtung geschiehet hier, wahrscheinlicher massen, gleich bey andern Pflanzen und Bäumen, ebenfalls vermittelst Aufplazung des Antherenstaubs, auf der Narbe, durch welche der Befruchtungssafft aus denen Körngen des Antherenstaubs, vermittelst zarter Röhrgen, der jungen Frucht zugeführet wird. Welches alles die Figuren 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. deutlicher erläutern werden (*).

La Poudre Anthérique, lorsqu'elle se creve, les rend probablement aussi fertiles comme les autres Arbres & Plantes, & cela se fait sur la Cicatrice, par laquelle le Suc fructifiant, qui sort des Grains de la Poudre Anthérique parvient à l'Embrion moyennant de tendres Tuyaux. Les figures 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. donneront du jour à tout cela. (*)

Oefnet man nun ein noch zartes Fruchtbehältnus, so siehet man den Embryo, mit einer grünen Hülle umgeben, noch ganz weis, darinnen liegend.

Si on ouvre une de ces tendres Gardes de Semence, on y voit l'Embrion, qui est enveloppé d'une couverture verdâtre, couché encore tout blanc.

Nach 8. 10. biß 14. Tagen, lassen sich die besten Untersuchungen damit anstellen, weil alsdenn die Frucht etwas grösser, die Schaale des Kerns aber noch nicht hart ist, sondern sich bequem durchschneiden lässet.

Les Recherches qu'on en veut faire, ne se font mieux qu'apres 8. 10. ou quinze jours, parce que le Fruit est alors un peu plus grand, la Coquille au contraire n'est pas encore si dure, mais fort facile à couper.

Es ist niemanden unbekannt, daß die Kirschen, wie fast alle andere Steinfrüchte, eine Furche auf der einen Seite, nach der Länge vom Stiel herab biß zum Buzen oder Punkt, sehen lassen, wo zuvor der Pistill stunde.

Tout le monde sait que les Cerises font voir comme presque touts les fruits à Noyau, un Sillon d'un Côté du long de la Queüe jusqu'au Point, où étoit auparavant le Pistil.

Ich habe lange Zeit vergeblich mich bemühet, ausfündig zu machen, ob diese Furche nur aussen in der Haut liege, oder sich durch das ganze Fleisch der Kirsche erstrecke? ob sie ein Röhrchen, eine Faser, oder die sogenannte Nabelschnur des Embryons seye, oder zu was sie sonst der Schöpffer der Natur, bestimmt haben möge?

J'ai travaillé long tems en vain à découvrir, si ce sillon étoit seulement peut-être dehors dans la Peau, ou s'il s'étendoit par toute la chair de la Cerise, ou s'il étoit un Tuyau, une Fibre ou le Cordon de l'Embrion, ou à quoi le Createur de la Nature l'avoit destiné?

Zu dem Ende zertheilte ich junge Früchte, 16. 17. nach der Länge 18. und nach der Quere 19.

J'ai coupé pour cet effet de jeuns Fruits 16. 17. au long 18. & au travers 19.

Ich merkte aber, daß sich der noch weiche Kern, oben und unten, in die Höhe heben liesse, ohne daß derselbe an einer Faser oder Fiber, welche man für eine Nabelschnur hätte ansehen können, hangend geblieben wäre. Doch hinten am Rucken, wo er noch in der Tiefe des Fleisches lage, blieb er veste steckend, und wollte sich so leichte nicht loßmachen lassen.

Mais je sentois d'abord que le Noyau encore tendre pouvoit être remué en dessus, & en dessous, sans qu'il ait tenu à une Fibre ou Fibrille, que l'on auroit pû prendre pour un Cordon. Il ténoit néanmoins ferme par derriére au dos, où il étoit encore couché dans le creux de la chair, & ne pouvoit être degagé qu'avec peine.

Dieser merkliche Widerstand, gab mir Anlaß, eine Frucht nicht von der Seite aufzuschneiden, wo die gedachte Furche herunter zu lauffen pflegt, sondern von der glatten Fläche; ich öfnete sie aber nicht sogleich durch die ganze Helfte in zwey gleiche Theile, sondern nahm das Fleisch nach und nach von oben so lange gemächlich weg, biß ich den Kern erblickte. Sodann lößte ich das was um denselben rings herum befindlich gewesen, ebenfalls behutsam ab, damit ich den Kern nicht beschädigte, und bemühte mich endlich, denselben aus seinen Lager, zu heben.

Cette resistence sensible me porta d'ouvrir un Fruit, pas du Côté, où le dit Rayon descend ordinairement, mais du Côté uni. Je ne l'ai pas coupé d'abord en deux parties égales, mais j'ai tant séparé la Chair petit à petit d'en haut, jusqu'à ce que j'ai vû le Noyau. J'ai détaché alors tout ce qui s'est trouvé autour avec précaution, pour que je ne blessois point le Noyau, & j'ai taché enfin de le tirer de sa Couche profonde.

Hier spührte ich nun abermalen von der Seite des Ruckens, einen kleinen Widerstand; als ich aber den Kern abgelößt hatte, sahe ich die Ursache schon mit blossen Augen, und entdeckte zugleich mit einem heimlichen Vergnügen, daß die Furche durch das ganze Fleisch sich erstrecke, welche von innen an der Wand, deütlich zu

Là je m'appercevois encore d'une Résistence du Côté du dos; ayant enfin séparé le Noyau, j'en voyois tout de suite la Cause, & je découvrois à mon grand plaisir que le Rayon s'étendoit par toute la Chair, lequel Rayon se faisoit voir distinctement par dédans au mur, & auquel le

Noyau,

(*) Es ist mir zwar die Ermahnung zugekommen, auf die Befruchtung durch den Blumenstaub, kein System zu bauen, weil solche noch jetzo sehr grossen Zweifel und Widerspruch ausgesetzt wäre: Da mir aber noch zur Zeit keine andere Bestimmung des Antherenstaubs mitgetheilt werden mögen, ich auch nicht weiß, wie die Strittigkeiten entschieden worden, so sich zwischen Herrn Prof. Kästnern und Herrn Millern auch andern dießfalls geäussert haben, so wird es mir vergönnet seyn, so lange bey dieser Meynung zu bleiben, biß ich einer gründlichern werde belehret worden seyn.

(*) Je sai bien le conseil qu'on m'a donné de ne pas établir un Système sur la Thèse que la Poudre Anthérique rendoit les Arbres fertiles parce que cela n'etoit pas encore trop assuré: mais comme je ne connois d'autre Destinations de la Poudre Anthérique jusqu'à ce moment, & je ne sai non plus, comme la Dispute s'est terminée entre Mr. le Professeur Kæstner & Mr. Miller & autres, on m'accordera de garder ce sentiment jusqu'à ce qu'on m'en donnera un plus solide.

sehen war, und woran der Kern, den ich erst herausgenommen, mit dem Rucken oder der hintern Seite, wenn ich so sagen darf, gelegen hatte.

Denn ich betrachte hier die Seite welche ich vom Fleisch entblößte, jezo als die vordere, um meine Beobachtung darnach beschreiben und erklären zu können.

So bald nun der Kern aus dem Fleisch genommen ist, siehet man unten an der hintersten Wand seines Lagers, eine weisse markigte kleine Erhöhung, welche ich den Nabel der Frucht, mit Recht nennen kan. Dieser weisse Punkt, ist mit dem Fleisch und dem Kern so genau verbunden und zusammen gewachsen, daß man in Warheit eine kleine Gewalt nöthig hat, solche von einander zu trennen. So oft es aber geschieht, so muß der Kern, diesen Theil zurücke lassen, und dann erblickt man an der Stelle, wo dieser Nabel am Kern gesessen, die an allen harten Kirschen-Schaalen aussen befindliche kleine Furche, und diese ist dann nichts anders als der Ort, durch welchen der Embryo, besonders aber sein noch ungemein zarter fast unsichtbarer Keim, die Säfte zu seinen Wachsthum, biß zu seiner gänzlichen Reife erhält, so wie an einem Menschen der Ort ebenfalls Lebenslang ersichtlich bleibt, wovon die Nabelschnur abgenommen worden ist.

Das Theilgen aber, das am Fleisch in der Grube zurück bleibt, ist Trichterförmig; das breite runde Theil, liegt auf der Schaale des Kerns, und die Spitze desselben, steckt im Fleisch an der Wand, und läuft in die Furche, die man auch aussen siehet. Wo aber diese Furche entstehet, will ich nun ebenfalls zeigen. Biß daher ist dieselbe innerlich, im Fleisch der Frucht, betrachtet worden, und da sie uns nun wieder auf die äussere Fläche derselben führet, so müssen wir sie weiters verfolgen, und es wird nicht schwehr seyn, sie biß zu ihren Ursprung zu finden.

Sie läuft von dem untersten Punkt der Frucht, auf welchen erstlich der Griffel gestanden hat, hinauf, biß zum Trichterförmigen Theil des Stiels, und von demselben durch den ganzen Stiel, biß in die Knospe, in welcher der Stiel und die ganze Blühte, mit ihrer Frucht gebildet worden ist.

Es ist also dieses, nach meinem Dafürhalten, ein deutlicher Beweiß, daß diese Furche als ein nöthiger Theil der Frucht, sammt dem Stiel, schon in der Knospe entstanden, ob sie schon dem Auge nach unsichtbar ware.

Es ist ferners daraus zuschliessen, daß der Embryo seine besten Säfte, zum Wachsthum, aus dem Ast durch den Stiel, und diese Furche erhalte, welche mit Recht die Nabelschnur des jungen Embryons kan genennet werden; und daß auch das Fleisch, die Haut, und die übrigen Theile der Frucht, ebenfalls aus dem Stiel, ihre Reife erlangen, weil besondere Gefäße oder Röhrgen darinnen enthalten sind, welche aus dem Stiel in die Frucht sich erstrecken, und sich sowohl im Fleisch derselben, als an der äussern harten Schaale des Kerns, in verschiedenen Aesten, austheilen, und durch gute Vergrösserungsgläser entdecken lassen.

Ich betrachte also an einer jungen Weichsel oder Kirschen Frucht folgende Theile.

(a) Aeus-

Noyau, que je venois d'en ôter, tenoit avec le dos.

Car je prends ici le Côté que j'ai séparé de la Chair & qui est vis à vis du Rayon, pour le Côté antérieur; pour en pouvoir décrire & expliquer mes Obsérvations.

Aussitôt que le Noyau est tiré de la chair, on voit alors par en bas au dernier côté de sa couche, une petite elevation blanche moëlleuse, laquelle je puis nommer avec raison le Nombril du Fruit. Ce Point blanc tient si fort à la Chair & le Noyau qu'on a en verité bien de la peine à les séparer. Mais autant de fois que cela se fait, le Noyau doit alors laisser en arrière cette Partie, & on voit alors à la place, où ce Nombril tenoit au Noyau, ce petit Rayon, qui se trouve dans toutes les Ecales des Cerises, & ce n'est que l'endroit, par lequel l'Embrion, & particulairement le petit tendre Germe, qu'on a de la peine à le voir, obtiennent le Suc nourricier tant néceſſaire à sa végétation jusqu'à ce qu'il soient parvenus à leur Maturité entière, tout comme on peut voir l'endroit à l'homme toute sa vie, où on a coupé le Cordon.

Mais la Particule, qui reste à la Chair dans le creux, a la forme d'un Entonnoir; la Partie large & ronde se répose sur l'Ecale du Pepin, sa Pointe se fourre dans la Chair & descend au côté dans le Rayon, que l'on voit déja du déhors. Je vais montrer à présent d'où raît ce Rayon. Je l'ai obsérvé jusqu'ici intérièurement dans la chair du Fruit, & comme il nous mene actuellement sur sa face extérièure, nous nous voyons forcé de l'y suivre, & il ne sera pas difficile, de le trouver dans son origine.

Il va du dernier Point du Fruit, sur lequel l'Aiguille se trouvoit auparavant jusqu'à la Partie de la Queuë qui a la forme d'Entonnoir, & de celle-ci par toute la Queüe jusque dans le Bourgeon, où la Queuë avec la Fleur & son Fruit ont été formées.

Cela prouve donc clairement, à ce qu'il me semble, que ce Rayon, comme un Partie nécéssaire du Fruit, avec la Queuë exiſtoit déja dans le Bourgeon, quoiqu'on ne le puisse pas encore voir.

Cela prouve, que le Germe tire ses meilleurs Sucs nécéssaires à sa Végétation par le Bourgeon & la Queuë du Fruit, moyennant ce Rayon, que l'on peut nommer avec raison le Cordon du jeune Embrion: & cela prouve que la Chair, la Peau & les autres Parties du Fruit, obtiennent de même leur Maturité de la Queüe, parce qu'il s'y trouvent des Vases particuliers ou petits Tuyaux qui s'étendent de la Queüe jusqu'au Fruit, & se divisent en differentes Branches, si bien dans sa chair que dans l'Ecale extérièure du Pepin, & qui sont visibles moyennant un bon Microscope.

J'observe donc au Fruit d'un jeune Cerisier, ou qui porte des Biggareaux ou Griottes, &c. les Parties suivantes.

(a) Ex-

(a) Aeuſſerliche, und (b) innerliche.

Die Erſtern, als die äuſſerlichen, ſind (c) der Stiel, mit ſeiner von oben aus der Knoſpe biß zur Frucht nach der Länge herablauffenden Furche, in der Haut oder Epidermis (d). Dann die Frucht (e) mit eben dieſer Furche und dem Punkt oder Buzen (f) den der abgefallene Griffel, hinterlaſſen hat.

Die innerlichen Theile ſind: im Stiel die Röhrgen ſo in das Fleiſch der Frucht lauffen (g) ſammt der Nabelſchnur (h) ſo ebenfalls in das Fleiſch dringet.

In der Frucht aber, die erſte Lage des Fleiſches; (i) die zweyte Laage (k) aus welcher ſich die äuſſerſte Steinſchaale des Kerns bildet; die Höle oder Mutter der Frucht; (l) die durchlauffenden Saft- und Nahrungsgefäße; (m) das Zellengewebe oder die Utriculi der Frucht; (n) das holzigte Weeſen (o); der Stein oder die harte Schaale des Kerns (p) mit ſeinen Fibern (q) und denen übrigen beeden Häuten welche den Kern ninhüllen; das Zellengewebe des Samens; (r) der Keim (s) *

Nota. Die zweyte Haut des Kerns, welche zwiſchen der harten Schaale und dem Kern liegt, iſt an gar jungen Früchten noch nicht zu zu entdecken, ſondern klebt noch an der Schaale p. und löſt ſich erſt von ihr ab, wenn die Frucht reif werden will.

Hiemit hoffe ich nun meinem Verſprechen ein Genügen geleiſtet und ſo viel hier der Raum mir zu laſſen wollen, gezeigt zu haben, woher die in denen Steinfrüchten befindliche Furche komme, was ſie ſeye, und wozu ſie von dem Schöpffer wahrſcheinlich beſtimmt worden? nehmlich zur Nahrung des Kerns, ſeines Keims und ganzen Wachsthums. Wie aber dieſer ſich bilde wird die 22ſte Figur erläutern.

Noch iſt übrig, die Erklärung ſämtlicher Figuren, ſo die XIte Kupfertafel zeigt; und dieſe würden, was etwa noch ermangeln möchte, vollends gar vorſtellen.

Figur (1) Iſt ein Blühtzweig eines ſogenannten Weixelbaums deſſen Früchte ſauere Kirſchen gemeiniglich, bey uns aber Weixeln, genennet werden; mit einigen Blumen (2) und einer Blätter-Knoſpe. (3) Die (4te) Figur zeigt eine offene Blume mit der Laage ihrer Befruchtungstheile, welche die (5te) Figur etwas mehr als natürlich groß noch beſonders vorſtellet.

Fig. (6.) Ein Staubträger, mit 2. gedoppelten gelben Staubbeutelu, und ihren goldgelben Antherenſtaub; durch Nro. 5. vergröſſert.

Fig. (7.) (Ebenfalls durch Nro. 5. vergröſſert) ein Griffel, ſammt dem Wärzgen, deſſen Oeffnung oben in der Narbe, wann es zumal einige Tage alt, ſtark zu ſehen iſt.

Fig. (8.) Stellet den Weitzenförmig- braungelben Antherenſtaub vor, der

Fig. (9.) rund im Waſſer, an Farbe aber ſehr bläß und mehr weiß als gelb ſiehet, auch ſehr langſam ſeine innerliche Subſtanz auswirft.

10. Ein Kelch in natürlicher Gröſſe, mit dem Ort wo die Staubträger ſtunden.

Fig.

(*) Dieſe hier gebrauchte Buchſtaben, befinden ſich nicht auf den Kupfertafeln, ſondern dienen hier nur ſtatt der Zahlen; welches man zu mehrer Deutlichkeit nicht unangemerkt laſſen ſollen. Die Erklärung der Figuren, wird ſolches mit Zahlen erläutern.

(a) Extérièures & (b) Intérièures.

Les Extérièures ſont (c) la Queüe avec ſon Rayon, qui deſcend au long du haut du Bourgeon jusqu'au Fruit, dans la Peau ou l'Epiderme (d) Après cela le Fruit (e) avec ce même Rayon & le Point (f) que l'Aiguille, qui eſt tombée, a laiſſé en arrière.

Les Parties Intérièures dans la Queüe ſont les petits Tuyaux, qui vont dans la Chair du Fruit, (g) avec le Cordon (h) qui entre de même dans la Chair.

Mais je remarque dans le Fruit, la prémière Couche de la Chair (i), la ſeconde Couche (k), d'où naît la dernière Ecale du Pepin, le Creux ou la Matrice du Fruit (l), les Vaſes du Suc & Nourriciers (m), le Tiſſu de Cellules ou les Utricules du Fruit (n), l'Eſſence boiſeuſe (o), la Pierre ou l'Ecale du Pepin (p) avec ſes Fibres (q), & les deux autres Peaux, qui enveloppent le Pepin, le Tiſſu de cellules de la Semence (r) & le Germe (s) *.

Nota. La deuxième Péau du Pepin, qui ſe trouve entre l'Ecale & le Pepin, ne peut pas encore être decouverte à un Fruit bien jeune, mais s'attache encore à l'Ecale (p) & ne ſe detache que lorsque le Fruit commence à meurir.

J'eſpere d'avoir rempli ma Parole, & d'avoir montré autant que l'eſpace m'a permis, d'où vient le Rayon, qui ſe trouve dans les Fruits à Noyau? ce qu'il eſt? & à quoi le Createur l'a probablement deſtiné? ſavoir à nourrir & faire végéter le Pepin. La Figure 22. expliquera, comme il ſe forme.

Nous avons encore à expliquer toutes les Figures de la Table X. & XI. & d'y ajouter ce qui pourroit encore manquer aux Obſervations précédentes.

Fig. (1.) Eſt un Bourgeon d'un Griottier avec quelques Fleurs (2) & un Bouton qui pouſſe des Feuilles. (3) La 4ème Figure montre une Fleur ouverte avec la Poſition de ſes Parties genitâles, que la Fig. (5) préſente ſéparement, un peu plus groſſie qu'elle eſt naturellement.

Fig. (6.) Eſt un Porteur de l'Anthêra, avec 2. jaunes Bourſes de Poudre doublées, & ſa Poudre Anthêrique jaunâtre; groſſi par No. 5.

Fig. (7.) (De même groſſi par No. 5.) une Aiguille, avec la Verrüe, l'Orifice de laquelle l'on peut bien voir en haut au milieu de la Cicatrice, ſurtout s'il eſt agé de quelques jours.

Fig. (8.) Préſente la Poudre Anthêrique brune & jaunâtre en forme de Froment, qui

Fig. (9.) Eſt ronde dans de l'eau, mais bien pâle en couleur, & plus blanche que jaunâtre, & qui jette très lentement ſa Subſtance intérièure.

(10.) Une Coupe dans ſa Grandeur naturelle, avec l'endroit ou étoient les Porteurs de l'Anthêra.

Fig.

(*) Les Lettres que j'ai employé ici, ne ſe trouvent pas ſur les Planches, mais tiennent ſeulement la Place des Nombres; c'eſt ce que je voulus obſerver ici.. L'Explication des Figures par des Nombres, le fera voir.

Fig. 11. Eine Blüht-Knospe, um den ganzen Kelch zu zeigen, nebst dem Fruchtbehältnus.

12. Ein Kelch mit dem blossen Pistill.

13. Ein geöffneter Kelch, um das Lager des Embryons sichtlich zu machen.

14. Der ganze Pistill, frey, ausser dem Kelch.

15. Ein Pistill mit geöffneter Frucht, um den Kern vorzustellen h.

16. Eine junge Frucht von 8. Tagen.

17. Dieselbe etwas gar weniges vergrössert, die Furche zu bemerken.

18. Eben diese zarte Frucht senkrecht herab, durchschnitten und

19. nach der Zwerch getheilt. Hier siehet man

a. die Haut (Epidermis) so noch grün ist.

b. Die erste Lage des Fleisches, so braun gelb, mit etwas roth und grün, vermischt siehet.

c. Die zweyte Laage, so blaßgrün anzusehen ist und mehr in das Weise fällt. Diese zweyte Reyhe Fleisch wird endlich so hart als Stein und macht die äusserste harte Schaale des Kerns, wie ich bereits gedacht habe.

d. Die Mutter oder Vertiefung, in welcher der Kern liegt.

e. Die äussere harte Schaale des Kerns.

f. Das Mark oder das harte Bestand-Weesen des Kerns, so die beeden Saamen-Lappen werden.

g'. Der Buzen oder Punkt, den der Griffel der Blüht zurückgelassen und gebildet hat.

h. Etwas vom Stiel, mit denen Gefäßen so aus demselben durch das Fleisch der Frucht, lauffen.

Fig. 20. Ein klein Zwerchschnittgen vom Kern, natürlich.

21. Dasselbe vergrössert. Dessen äusserer Zirkel oder Rand, ist die harte Schaale, so aus sehr kleinen runden Theilgen bestehet, und obschon durch Nro. o. solche beobachtet worden, so erschienen sie doch nicht grösser als das allerkleinste Pulverkörnlein.

Die innere Substanz, ist aus gleichen und ungleichen Sechsecken zusammen gesezt, oder vielmehr aus sechseckigten Bläsgen, Zellen oder Utriculis, so insgesamt mit einem klebrigten Saft angefüllet sind, der mit dem Alter der Frucht sich immer mehr und mehr erhärtet, und endlich das Bestandweesen einer Mandel oder einer Haselnuß, bekommt.

Fig. 22. Soll die Bildung des Kerns etwas näher vorstellen.

a. Ist die erste Anlage des Kerns. Ein eyförmiger kleiner mit kleberigten Saft angefüllter Körper. Dieser liegt in einer ausgedehnten ovalen Blase b. und erweitert sich in derselben nach und nach, von Tag zu Tag. Welches ich hier mit denen verschiedenen punktirten Zirkeln c. anzeigen wollen.

Fig. 11. Un Bourgeon, pour faire voir la Coupe entière avec le Garde-Fruit.

12. Une Coupe seulement avec le Pistil.

13. Une Coupe ouverte, pour pouvoir montrer la Couche des Embrions.

14. Le Pistil entier, dégagé hors de la Coupe.

15. Un Pistil avec le Fruit ouvert, pour que l'on puisse répréfenter le Pepin.

16. Un jeune Fruit, agé de 8. jours.

17. Le même peu grossi, pour pouvoir remarquer le Rayon.

18. Le même tendre Fruit coupé perpendiculairement &

19. Divisé de travers. On y voit.

a. La Peau (l'Epiderme) qui est encore verde.

b. La prémière Couche de la Chair qui est brune & jaunâtre, & melée de rouge & verd.

c. La deuxième Couche, qui est verdâtre & donne plus dans le blanc. Cette deuxième Couche de la Chair, devient à la fin aussi dure qu'une Pierre, & fait, comme j'ai dit l'Ecale du Pepin.

d. Là Matrice, dans laquelle s'est couché le Pepin.

e. La Peau dure extérièure du Pepin.

f. La Moëlle ou la Substance dure du Pepin qui deviement les deux prémières Feuilles épaisses qui nourissent le petit Germe.

g. Le Point, que l'Aiguille de la Fleur a formé & laissé au Fruit.

h. Quelque chose de la Queüe, avec les Vases qui en sortent & passent par la Chair du Fruit.

Fig. 20. Une petite coupure du Pepin, naturellement, &

21. La même grossie. Le dernier Cercle de laquelle est l'Ecale, qui est composée de très petites Particules rondes, & quoique je les aie observé par Nr. o. elles paroissent néanmoins pas plus grandes que le moindre Grain de Poudre.

La Substance intérièure est composée des Hexagones égaux & inégaux, ou plutôt des Vesicules, Cellules, & Utricules hexagones, qui sont tous remplis d'un Suc gluant, qui devient de plus dur avec l'âge du Fruit, & obtient à la fin la Substance d'une Amande ou Noisette.

La fig. 22. Doit représenter la formation du Pepin de plus près.

a. Est la prémière Formation du Pepin. Un Corpuscule en forme d'oeuf rempli d'un Suc gluant. Il est couché dans une Vesicule ovale allongée, & s'y étend petit à petit de jour en jour. C'est ce que je voulus montrer par ces differents Cercles marqués de Points

wollen. d. Sind die Gefäße welche aus dem Stiel in das Fleisch der Frucht lauffen (*).

Fig. 23. Erklärt den Ursprung und den Nutzen der Furche oder Nabelschnur, welche bey a. durch den Stiel herab in die Frucht b. sich erstrecket. Diese Figur zeigt sich hier in dem Zustand, wann das Fleisch von der Frucht auf der Seite abgenommen ist, wo die Furche c. war. Dann so ihr der der Umbilikus abgenommen ist, der an der Wand klebend zurück bleibt, wie die 24. Figur bey d. vorstellet, so siehet man die Narbe e. auf dem Kern f. durch welche ihm der Saft zum Wachsthum, durch den Nabel, zugeführet wird.

Die Figur 24. wird diese Erklärung vollständiger machen, weil hier der weisse Trichterförmige Theil, an der Wand der Grube oder Gebähr-Mutter, zurückgeblieben ist, der zuvor mit dem Kern f. bey e., vest verbunden ware. An diesem Theil d. laufft die Furche herab; und hier ist die vergrösserte Frucht von der glatten Seite, geöffnet, vorgestellet, welche mit der andern auf dem Rucken liegt, so die Furche hat: Daher ich dann auch die durchdringende Furche oder Nabelschnur, von innen entdecken und vorstellen können, welche ich hier mit einer weissen Linie angezeigt, und diese Mutterhöle mit (g), die weisse Furchenlinie aber mit (h) in derselben bemerket habe.

Figur 25. Entdecket die Saftgänge, so aus dem Stiel in die Frucht, gehen. Der Stiel und die Frucht sehen an dem Ort wo diese Kanäle sich zeigen, einer Kapsel gleich. Die Loßmachung des Stiels von der Frucht, kan, zumal bey jungen Früchten, nicht anderst als mit Gewalt geschehen, weil alle diese Fibern oder Röhren (i) zu gleicher Zeit entzwey gebrochen, und der Stiel aus den Leisten oder dem Rand seiner Kapsel, gehoben werden muß (k).

Fig. 26. Bemerkt an dem etwas vergrösserten Stiel, diese Rinne nach ihrer ganzen Länge, wie sie gerad durch die Mitte, herunter läufft (l).

Fig. 27. Ist die vergrösserte Helfte des Kerns (f) von seinen spizigen oder untern Theil anzusehen, welcher aber in der Kirsche, unten, gegen den Buzen (c), oder runden Theil, gekehrt, liegt. Auf der einen Seite desselben, ohnweit der Spize, siehet man den Nabel (m) oder den Ort, der in der Kirsche an (d) Figur 24. veste gesessen, und durch welchen der ganze Kern sein Wachsthum erhalten hatte.

Fig. 28. Zeigt die obere Helfte des Kerns, welche rund, und mit sehr feinen Röhrgen an seinen äuserstен sehr zarten Häutgen, durchflochten ist. n. Dieses Häutgen lässet sich nicht ehender entdecken und untersuchen, als biß das Mark des Kerns anfängt hart zu werden.

Fig. 29. Ein gar kleines Stückgen von der äuserstен Haut (Epidermis) einer Kirsche, so halb reif ist, und anfängt roth zu werden.

Fig. 30.

(*) Den Keim entdeckt man nicht ehender als wenn die Keimlappen anfangen hart zu werden. So lang diese noch weich und flüssig sind, siehet der Keim ihren Bestandwesen vollkommen ähnlich, und ist ebenfalls durchsichtig. Er bestehet aber anfänglich aus einem kleinen Bläsgen, und wird endlich hart wie die Lappen. Er liegt zu unterst an der Spize des Kerns, und ist aussen am Kern am deutlichsten zu entdecken.

Points (c). d. sont les Vaſes qui courent de la Queuë dans la Chair du Fruit. (*)

La fig. 23. Explique l'origine et l'uſage du Rayon ou Cordon, qui s'etend de l'a. par la Queue iusqu'au Fruit. b. Cette Figure ſe préſente ici dans l'état, lorſque la Chair a été ſeparée du Fruit de ce côté, où étoit le Rayon. c. Car auſſitôt qu'on en a oté l'Umbilic, qui a reſté au côté, voyès la fig. 24. litt. b., on voit alors la Cicatrice e. ſur le Noyau f., par laquelle il obtient moyennant l'Umbilic le Suc néceſſaire à ſa Végétation.

La fig. 24. Fera voir cela plus diſtinctement, parce que la Particule blanche en forme d'entonnoir a reſté au côté de la Matrice, qui étoit auparavant fort lié avec le Noyau f. à la lettre e. Le Rayon deſcend de long de cette Particule d. Et voici le Fruit ouvert et groſſi, répréſenté du côté uni, qui et couché de l'autre côté ſur le dos du Rayon. Cela m'a mis en état, de pouvoir decouvrir et montrer le Rayon ou Cordon, qui paſſe le Fruit, en dedans, et que j'ai marqué d'une Ligne blanche, ſavoir cette Matrice avec g., et cette Ligne blanche du Rayon avec h.

La fig. 25. Montre les Canaux du Suc, qui vont de la Queuë dans le Rayon. La Queue et le Fruit reſſemblent dans l'endroit, où ces Canaux ſe montrent, à une Capſule. On ne ſauroit detacher la Queue du Fruit, ſurtoût aux jeuns Fruits, qu'avec force, parce qu'il faut qu'on rompe toutes ces Fibres ou Canaux i. en même tems, et qu'on enleve la Queuë de la jointure de ſa Capſule k.

La fig. 26. Obſerve à cette Queuë un peu groſſie, ce Rayon de toute ſa longueur, comme elle deſcend en droiture par le milieu. l.

Fig. 27. Eſt la moitié du Noyau groſſi. f. comme il ſe préſente de ſa Partie pointuë ou inférieure, mais qui eſt couché dans la Ceriſe tout en bas, tourné vers le Point ou Partie ronde. On voit d'un côté, pas loin de la Pointe, le Cordon m. ou l'endroit qui tenoit bien ferme à la lettre d. fig. 24. dans la Ceriſe, et moyennant lequel le Noyau obtenoit ſa Végétation.

La fig. 28. Montre la Partie ſupérieure du Noyau, qui eſt ronde et entrelacée de Tuyaux très fins à ſon Epiderme fort tendre. n. On ne ſauroit plutôt découvrir et examiner cette Peau que jusqu'à ce que la Moelle du Noyau commence à durcir.

Fig. 29. Fait voir un fort petit morceau de l'Epiderme d'une Ceriſe, qui eſt moitié mure, et qui commence à devenir rouge.

(*) On ne voit pas plutôt le Germe que lorſque les Orillons commencent à devenir durs. Tant qu'ils ſont encore tendres et fluides, le Germe reſſemble tout à fait à leur Subſtance, et il eſt de même transparent. Il n'eſt au commencement q'une petite Veſicule, et durcit à la fin comme les Lambeaux ou les Orillons. Il eſt couchè à la derniére extremité du Noyau, et il ſe préſente le plus diſtinctement au dehors du Noyau.

Fig. 30. Daſſelbe vergröſſert, durch Nr. 3. Sie iſt ein Gewebe von theils gleichen theils ungleichen Sechs-Ecken, welche mit Blaſenähnlichen Zellen, ausgefüllt ſind, in welchen ein körnigtes klebrigtes Rubinrothes anfänglich aber grünes Weſen, enthalten iſt, welches aus unbeſchreiblich kleinen Theilgen beſtehet, die man nur durch die ſtärkſten Vergröſſerungen, ſiehet.

Et fig. 30. Le même groſſi par Num. 3. C'eſt un tiſſu des Hexagones tant egaux qu'inegaux, qui ſont remplis de Cellules reſſemblantes aux Veſicules, dans lesquelles ſe trouve une Subſtance gluante, qui eſt dabord verdâtre et après couleur de Rubis, laquelle Subſtance conſiſte en une Infinité de petites Particules, que l'on ne peut voir que moyennant le plus fort Microſcope.

Fig. 31. Etwas vom noch grünen Fleiſch der Kirſche, welches in Ey runden Zellen lieget, wie daſſelbe

Fig. 31. Quelque choſe de la Chair encore fraîche de la Ceriſe, qui eſt couchée dans des Cellules ovales comme

Fig. 32. vergröſſert darſtellet. Wann es reif iſt, ſiehet es goldgelb und Purpurroth.

La fig. 32. La montre groſſie. Quand elle eſt mure, elle eſt couleur d'or ou pourprée.

Fig. 33. Ein gar geringes Theilgen von der Haut des Kerns oder der innern Schaale.

Fig. 33. Une très petite Particule de la Peau du Noyau ou de la Peau intérieure.

Fig. 34. Solches vergröſſert durch Nr. 0, um zu zeigen, daß es aus ſehr kleinen runden Körpern zuſammengeſetzt iſt, durch welche hier und dar, zarte Fibern oder Röhrgen durchſtreichen, ſo ohne Zweifel mit dem Fleiſch der Kirſche, verbunden ſind; oder aus demſelben ihren Urſprung haben werden.

Fig. 34. La même groſſie par Nro 0, pour faire voir qu'elle eſt compoſée de très petits Corps ronds, par lesquels paſſent ça et là de tendres Fibres ou Tuyaux, qui ſans doute ſont liés avec la Chair de la Ceriſe, ou qui en naîſſent.

Dieſe runden Beſtandtheilgen ſind ſo auſſerordentlich klein und eng beyſammen, daß man ſie kaum entdecken kan. (*)

Ces Particules ſubſtantielles rondes ſon ſi petites et ſerrées q'on a de la peine à les decouvrir. (*)

Anhang zur XI. Tafel.

Es hat Herr Winterſchmidt, der Verleger meiner Mikroskopiſchen Gemüths- und Augen-Ergözung in der Nachleeſe derſelben, auf der 42ſten Tafel, die Hämmerlein der Fliegen, womit ſie ihr Geſumſe oder den Schall im fliegen machen ſollen, ohne mein Begehren, aus eigenen Willen, und ohne mir dieſe ſeine Beobachtung zuvor gezeigt zu haben, mit angebracht.

Se. Excellenz der Herr geheime Rath von Gleichen, hat Ihn deswegen in Seiner Geſchichte der Stubenfliege zurechte gewieſen, und dieſe 2. Glieder, die Trommelſchlägel genennet, auch ſolche beſſer und richtiger abgebildet.

Weil ich nun bereits auf der 85ſten Tafel der Mikroſcopiſchen Ergözung, Figur 1. eben dieſe Glieder an der Müke oder Schnake, ſo vorgeſtellet habe, wie ſie ſich damalen durch eine geringe Vergröſſerung, von oben herab, anſehen laſſen; meine g. L. aber dadurch auf die Gedanken gerathen dörften, als ob ich unrichtige Zeichnungen geliefert hätte, indem man in der That dieſe Blaſen ganz anderſt ſiehet, wenn man ſie von der Müke abſondert,

Une petite Addition à la Table XI.

Le Sieur Winterſchmidt, l'Editeur de mes Amuſements Microſcopiques de l'Eſprit et des Yeux, a oſé ajouter, dans le Supplement, ſur la Table XLII., à mon inſçu les petits Marteaux des Mouches, moyennant lesquels on pretend qu'elles font un bruit ſourd en volant, et il a fait cela de ſon gré et ſans m'avoir montré auparavant ſes Obſervations.

Son Excellence Monſieur le Conſeiller Privé de Gleichen l'a par cette raiſon corrigé dans ſon Hiſtoire de la Mouche ordinaire, il a nommé ces 2. Membres les Baguettes, et il les a répréſenté avec plus d'exactitude.

Or comme j'ai répréſenté les mêmes Membres de la Mouche déja ſur la Table 85. fig. 1. de mes Amuſements Microſcopiques, comme ils ſe préſentoient alors par une ſimple Lunette; et pluſieurs de mes Lecteurs pourroient penſer que ſi j'avois manqué à donner des Deſſeins fideles, parce qu'on voit en effet ces Veſicules tout autrement, lorſqu'on les ſepare de la Mouche et les

(*) Wann ich hier der Kernſchaale gedenke, ſo iſt die Pergamentähnltche Haut darunter zu verſtehen. Denn der Kern ſelbſt liegt in 3. Schaalen, nehmlich 1) in einer ſehr feinen weiſſen, 2) in einer etwas dichten braunen, und 3) in der harten Steinſchaale.

Dieſe kan man nicht ehender voneinander unterſcheiden, als zu der Zeit, wann die Kirſche auſſen etwas roth werden will, und noch viel grünes an der Haut hat.

(*) Si je parle de l'Ecale, je ne veux deſigner par-là que la Peau qui reſſemble au Parchemin. Car le Noyau eſt enveloppé de trois Peaux, ſavoir 1), d'une Peau très fine et très blanche 2) d'une Peau plus epaiſe et brune, et 3) de l'Ecale.

On ne les ſauroit diſtinguer que lorsque la Ceriſe commence à devenir un peu rouge en déhors, et lorsqu'elle a encore beaucoup de verd à la Peau.

TAB. X.

Fig. 1.




M.F. Ledermüller del.

A.L. Wirsing Sc. et exc. Norimberg.

TAB. XI.

23.




24.




25.




26.



27.




28.



Observ. II.















M.F.L. del.

A.L.W. Sc.

dert, und besonders untersucht; so habe ich, theils um die Güte meiner Vergrösserunswerkzeuge, theils aber auch die Richtigkeit meiner Beobachtungen zu rechtfertigen, solche alhier dergestallt abgebildet, wie sie sich durch die höchste Vergrösserungen, nach verschiedenen Wendungen, meinem Auge gezeigt haben. Das Insekt von welchem ich diese Glieder, womit es sich im Gleichgewicht erhält, genommen, stellt die Figur A. vor. Die beeden Gewichtblasen aber B. B. in natürlicher Grösse, an den Ort, wo sie ihre Bestimmung haben.

C. Ist die vergrösserte Blase, welche in einer braunen Haut eingeschlossen liegt, und von der Fliege ausgespannt und eingezogen werden kan, wie D. und E. vorstellet.

Wird die ganze Gewichtstange oder Nerve trocken, so schrumpft die äussere rothbraune Haut, L. zurücke, daß die Blase K. frey zu liegen kommt. Sie hängt an einer Nerve, I. welche unten mit verschiedenen Aesten, sich mit der Blase verbindet, und diese Nerve ist in einer langen Röhre M. verwahrt, auf allen Seiten rings herum mit starken steifen Haaren besetzt, wie die Figur H. am besten zeigen wird. Diese Blase verrichtet also die Dienste eines Ruders, sowohl als des Gleichgewichts, gleichwie bey den Schwimmern die beeden Blasen; und vermittelst derselben, kan die Müke also, die Luft an sich ziehen und von sich stossen, wie sie es nöthig hat, welches alles der eigene Fleiß der Liebhabere, nicht ohne Vergnügen, noch deutlicher entdecken wird.

examine particulièrement; c'est pourquoi je les ai dessine ici, pour prouver la bonté de mes Microscopes, et l'exactitude de mes Desseins, de cette façon, comme ils se présentoient à mes Yeux par le plus fort Microscope. La fig. A. montre l'Insecte, duquel j'ai pris ces Membres, avec lesquels il tient la Balance. La fig. B. B. présente les deux Vesicules à la Nature, et à l'endroit, pour lequel ils sont destinées.

C. Est la Vesicule grossie, qui est enveloppée d'une Peau brunâtre, et laquelle la Mouche peut étendre et retirer selon la fig. D. et E.

Si le Nerf ou Contre-Poids devient sec, alors la Peau extérieure brun-rouge L. se retire de sorte que la Vesicule K. est dégagée de tout. Elle tient à un Nerf I. qui responde avec la Vessie, et ce Nerf est couché dans un Tuyau long M., lequel Tuyau est bordé de tous côtés de Cheveux forts et roides, voyès la fig. H. Cette Vessie lui rend, comme aux Nageurs, les mêmes services, elle lui sert des Rames et du Contre-poids; et c'est par elle que la Mouche peut prendre et chasser l'air, tout comme elle en a besoin, & c'est ce que des Amateurs industrieux sauront encore découvrir plus distinctement avec plaisir.

TABVLA XII.

Das merkwürdige an denen gefüllten Ranunkeln.

Die fünf Ranunkeln so ich hier auf dieser zwölften Tafel abgebildet habe, sind mir von dem Herrn Verleger dieser Blätter, selbst gebracht worden, mit dem Verlangen, das Mikroskopische daran, zu untersuchen.

Nun habe ich bereits meinen g. L. aufrichtig bekannt, daß ich das Zeichnen und Mahlen nie erlernet habe, daher bitte ich auch nochmalen meine Blätter nicht als Mahlereyen, sondern als Beobachtungen zu betrachten; glaube aber doch, aus einer Ueberzeugung die nicht aus Eigenliebe entspringt, daß ich allemal die Gestalt und Natur der Gegenstände so ich abzeichne, so ähnlich als mir möglich, schildere, wie ich sie denn auch jederzeit, meinen Herrn Verleger gegeneinander halten und mich gerne von demselben zu rechte weisen lasse, wo an der Zeichnung etwas abzuändern nöthig befunden wird. (*)

Ich erinnere dieses bloß von der ganzen Gestalt der Ranunkel, deren Farbe ich alhier natürlich und richtig angezeigt habe.

Die

(*) Daß meine Zeichnung jederzeit dem Objekt ähnlich sind, welches mir zur Beobachtung vorgelegt worden, wird wenigstens das unpartheyische Zeugnus Titl. des Herrn Hofrath Trews, jederzeit auf Verlangen versichern können.

LA TABLE XII.

Répréfente ce qu'il ya de remarquable aux Renoncules doubles ou farcies.

Les cinq Renoncules, dont je donne sur cette Table la Description, m'ont été communiquées de l'Editeur de cet Ouvrage-là, avec la priére de les observer avec le Microscope.

Mes Lecteurs se souviendront bien de l'aveu que je leurs fis, de n'avoir jamais appris l'Art de dessiner et de peindre, c'est pourquoi je les supplie de ne me regarder en qualité de Peintre mais homme qui observe seulement ces Objets. Néanmoins je crois sans me vanter, d'avoir toujours répréfenté la Nature et la Forme des Objets autant ressemblante qu'il m'étoit possible, je les ai en outre toujours montrè à mon Editeur pour me conformer à la Nature, et je reçois toujours ses Remarques avec plaisir, où il trouve à corriger ma Peinture. (*)

Je dis tout cela seulement de la Forme entiére de la Renoncule, les couleurs naturelles de laquelle j'ai indiqué ici avec beaucoup d'exactitude.

Je

(*) Monsieur le Conseiller Trevv prouvera à tout le monde que mon Dessin est toujours ressemblant à l'Objet qu'on m'a donné à observer.

Die bedeckten Theile hingegen, so ich mit denen Vergrösserungsgläsern betrachte, zeichne ich alleine, und gewiß mit aller möglichen Aufmerksamkeit, weil es fast ohnmöglich ist, jederzeit einen Künstler der Zeichenkunst dabey gegenwärtig zu haben; wie dann gemeiniglich wegen des künstlichen Schattens, den die Mahlerey erfordert, ein Mahler ganz andere Bilder liefern muß als der Beobachter, der durch seine Gläser alles hell, in vollem Licht und fast ohne Schatten siehet.

Je dessine au contraire les Parties cachées que j'ai observé avec le Microscope, séparement, et avec la dernière attention, parce qu'il est presqu' impossible, d'avoir toujours à son côté un Dessinateur achevé; de là vient qu'un Peintre sauroit mieux exprimer l'Ombre que cet Art demande qu'un Observateur, qui voit moyennant ses Lunettes tout sans ombre en pleine lumière.

Aus diesem Gesichtspunkt nun, wolle der g. L. alle meine Beobachtungen gütigst beurtheilen; nehmlich als Vorstellungen und Bilder, welche durch Vergrösserungsgläser abgesehen und gezeichnet werden müssen, und nicht als Meisterstücke eines Mahlers.

Dans ce Point de vuë je supplie mes Lecteurs de vouloir bien juger toutes mes Observations, c'est à dire comme des Répréſentations qu'il faut que je fasse et dessine moyennant le Microscope, et non pas comme des Chef d'oeuvres de la Peinture.

Was aber die Ranunkeln selbst betrifft, so wird hoffentlich auch niemand von mir verlangen, daß ich alhier die Sprache eines Gärtners führen oder eine Geschichte dieser Blumen liefern solle.

Pour ce qui concerne les Renoncules mêmes, on n'exigera point de moi à ce que je crois que je parle ici le Langage d'un Jardinier ou que je donne l'Histoire de cette Fleur.

Liebhabere werden schon Selbst wissen, wo Sie Sich Raths, wegen der Wart und Pflege derselben, erholen sollen.

Les Amateurs sauront d'eux mêmes, où ils doivent s'informer, comme il faut traiter ces Plantes.

Nota. So eben erinnere ich mich eines der prächtigsten und schönsten Werke, worinnen der Ranunkeln ebenfals gedacht worden, nehmlich unsers hochberühmten Herrn Hofrath Dr. Trews, allezeit im schönsten Flor stehenden Blumengartens; Ein Werk, welches ich allen wahren Gönnern und Freunden auserlesener Schönheiten der Natur, in dem Reich der Blumen, wünsche und anpreise; indem es nicht allein die allervortreflichsten Blumen, nach der Natur auf das netteste gebildet, vorstellet, sondern auch denen Gartenfreunden redlich und aufrichtig an die Hand giebt, wie eine jede Art von Blumen, gewartet und gepfleget seyn will. In eben diesem Werk sind auch die verschiedenen Arten der Rosen, der Martagonen, der Lilien sowohl als der Ranunkeln, und andere Blumen; welche auch immer mit mancherley neuen Arten von dem Herrn Verleger dieser Blätter vermehret, fortgesetzet, und bey Ihm zu haben sind. Ich weiß, daß es keinem Liebhaber gereuen wird, sich diesen ewigen Garten angeschafft zu haben.

Nota. Je me vois obligé de citer ici un de plus beaux et magnifiques Ouvrages, savoir le Jardin toujours en fleur de Mr. le Conseiller Trews un Ouvrage que je recommande aux Amateurs de la Nature dans le Regne des Plantes; parce qu'il ne présente pas seulement les Fleurs les plus charmantes, mais instruit aussi les Amateurs de quelle manière chaque Fleur veut être traitée. On y trouve aussi les differentes especes des Roses, Martagons, Lis, Renoncules et autres Fleurs avec ses nouvelles especes que l'Editeur de cet Ouvrage met au jour, et vend à présent. Je suis persuade que tout le monde sera content de cette acquisition, et ne regrettera jamais l'argent.

Der Abt Plüche hat in Seinem Schauplatz der Natur und dessen zweyten Theil, etwas gar weniges davon angebracht. Besser aber sind diese Blumen beschrieben, in dem Tractat von Ranunkeln, (*) so im Jahr 1746. zu Paris bekannt worden. Ich will nur etwas ganz weniges daraus entlehnen; daß nehmlich die grossen gefüllten Ranunkeln erst um das Jahr 1683. in Europa sollen bekannt worden seyn, als zu welcher Zeit sie der Grosvezier Kara Mustapha, um Seinem Gebiether die Begierde zur Jagd zu benehmen, aus Asien bringen lassen, von da sie zuerst nach Frankreich, und dann auch zu den Deutschen, sollen gebracht worden seyn.

Mr. l'Abbé Pluche en a parle en peu de mots dans le Tome II. du *Spectacle de la Nature*. Mais je connois un Ouvrage qui a vu le Jour à Paris 1746, où les Renoncules (*) ont été mieux décrites. Je vais en tirer quelques mots, savoir l'anecdote que les Renoncules Doubles n'étoient connues en Europe qu'en 1683, ou le Grand Vezier Kara Mustapha les fit venir de l'Asie, pour degouter son Maître de la Chasse, et elles ont été transportées en France, et de là en Allemagne.

Da aber denen ältesten Kräuterkundigen, (Bauhin), Tabernämontan, Clusius, Lobel, und andern, solche schon zuvor bekannt gewesen, so muß man dieses Vorgeben nur in gewiesen Schranken verstehen.

Mais on a raison d'en douter, parce que les plus anciens Botanistes, Clusius, Lobel et bien d'autres avant ces Messieurs, les ont déja connu.

Gemeiniglich werden sie in 3. Classen abgetheilt, nehmlich 1) in einfache 2) in halbgefüllte 3) in ganz gefüllte.

Communement on les divise en 3. Classes, savoir 1) les simples, 2) semi-doubles, et 3) doubles.

Die

Les

(*) Traité des Renoncules etc. Paris 1746. 8vo hat 6. Kupfer und 258. Seiten.

(*) Traité des Renoncules, à Paris 1746. in 8vo où Vous trouvès 6. Planches et 258. Pages.

Die einfachen haben 5. auch 6. Blätter; die halbgefüllten mehrere, doch aber nicht so viel als die ganz vollen; und die gefüllten bestehen aus einer von verschiedenen Reihen Blättern zusammengesetzten Blume, deren immer eine in der andern steckt.

Les Renoncules simples n'ont que 5. à 6. feuilles, les sémi-doubles en ont plus, mais pourtant pas tant que les Doubles; et les Doubles consistent en une Fleur, qui est munie de quantité de Feuilles fort serrées.

Die Wurzeln, aus denen die gefüllten gezogen werden, nennen die Gartenfreunde Klauen, und die von den Anemonen, Tazen.

Les Fleuristes appellent les Racines, qui produisent les Renoncules, Griffes, et les Racines des Anémones, Pattes.

Die gefüllten tragen keinen Saamen, und daran sollen sie die vielen Reihen Blätter hindern, welche sich biß an den Pistill erstrecken und den Platz einnehmen, wo die Staubträger zu stehen pflegen.

Les Doubles ou Farcies ne portent point de Semence, & on attribue cela à la très grande quantité de Feuilles, qui s'étendent jusqu'au Pistil & occupent la plate, où les Porteurs de l'Anthêra sont placés ordinairement.

Dieses ist was ich nöthig zu seyn erachtet, aus fremden Schriften zu entlehnen; und ich will nun zeigen, wie ich solche bey der Mikroskopischen Untersuchung, angewendet habe.

C'est ce que j'ai cru nécéssaire d'emprunter des Ouvrages de Fleuristes. Je m'en vais indiquer comme je m'en suis servi dans mes Observations Microscopiques.

Die erste Ranunkel, welche ich zergliederte war die rothe mit A. bezeichnet. Ich nahm ihr behutsam alle Blätter ab, so, daß mir nichts übrig blieb, als ein kleiner Busch F. auf dem grünen Stiel; und dieser war mit nichts als Staubträgern umgeben, welche vergrössert G. von forn und H. von hinten vorstellet. Die Beutel waren roth eingefaßt, und in der Mitte goldgelb auf einem rothgelben Stiel oder Staubträger, und voll Saftkugeln.

La prémière Renoncule que j'ai disséqué, fut la Rouge marquée litt. A. J'en ai ôté toutes les Feuilles avec beaucoup de précaution, de sorte qu'il ne me restoit qu'un petit toupillon F. sur la Queuë verde; & celle-ci n'étoit entourée que de Porteurs de l'Anthêra, qui se présentoient grossis par dévant comme G. & par derriére comme H. Les Bourses étoient bordées en rouge, dans le milieu couleur d'or sur une Queuë ou Anthêre melée du rouge & brun, & remplies de Globules du Suc.

Dieser Blume mangelten also die Griffel und Embryonen, oder der Pistill. Statt desselben aber war nur ein grüner fleischichter zugespizter Knoten, der sich nach der Länge, senkrecht durchschnitten, wie I. und nach der Quere wie K. betrachten liesse, und nichts als grünes Mark mit Fibern durchwachsen, enthalten hatte.

Les Aiguilles & Embrions ou le Pistil manquoient donc à cette Fleur. Elle avoit à sa place un Noeud verd de chair pointû, qui avoit la figure, étant disséqué perpendiculairement, comme J. & étant coupé à travers comme K. & qui ne contenoit que de la Moëlle verde entrelardée de Fibres.

Die zweyte Blume B. war weiß, spielte in das grüne, und hatte rosenfarbe feine Flecken an dem Rand ihrer Blätter. Gewiß eine sehr reizende und schöne Blume.

La deuxiéme Fleur B. étoit blanche, donnoit dans le verd, & avoit des taches couleur de Rose au bord de ses Feuilles. Voilà surement une Fleur très charmante & attraïante!

Diese ist nicht so vollblätterig gewesen, wie A. und also nur halbgefüllt. Nachdeme ich ihr ebenfalls die Blätter abgeschnitten, sahe ich etwas ganz anders als zuvor an A; nehmlich, eine starke Erhöhung L. welche ich anfänglich für den Pistill erkannte, und besser unten ringsherum die Antheren M.

Elle n'avoit pas tant de Feuilles comme celle-là marquée A. & elle étoit par conséquent Semi-Double. Après que je lui ai pris les Feuilles, je lui ai trouvé toute autre Chose qu'auparavant à l'A; savoir une Elevation considerable L; que je pris d'abord pour le Pistil, & j'y ai découvert les Anthêres M. un peu plus bas, qui l'entouroient.

Wer noch niemalen auf diese Art, die Befruchtungs-Theile einer Ranunkel gesucht hat, wird sie wohl schwehrlich, mit blosen Augen, für das ansehen, was sie doch würklich sind. Die Theilgen sind zu klein und liegen zu eng aneinander beysammen, und es ist nur ein Vortheil sie auseinander zu nöthigen, ohne sie zu verlezen.

Celui qui n'a jamais cherché les Parties Genitâles d'une Renoncule de cette façon, les prendra guéres pour ce qu'elles sont en effet. Les Particules sont trop petites & trop serrées, & il faut qu'on ait assès de capacité pour les separer, sans les blesser.

Ich bin gar nicht neidiſch, was beſonders zum Vergnügen meiner g. Leſer, und vielleicht zu einigen Nuzen in der Naturkunde, gereichen kan; daher will ich den kleinen Handgriff aufrichtig anzeigen, womit man den ganzen Piſtill, faſt zuſehends, entwickeln kan.

Je ne ſuis point entêté de chacher ce que pourroit faire plaiſir à mes Lecteurs! & être de quelque utilité dans la Phyſique. C'eſt ce qui me porte à montrer ici le coup de main, moyennant lequel on peut développer le Piſtil entier dans un inſtant.

So bald die Blätter mit einer feinen Scheere, rings um den Piſtill, abgenommen worden ſind, bringt man die Säule F., die man am Stiel der Blume läßt, in ein Glas Waſſer ſo, wie hier die Ranunkel, im im Glaße ♀ ſtecken, und läßt ſie einen Tag darinnen. Dieſes verurſacht, daß nicht alleine ſich die Griffel, ſondern auch die Antheren, erweitern und von einander geben: ſie werden gröſſer, ſie wachſen, und erhalten ihre völlige Reife, dergeſtalt, daß ſo gar der Antherenſtaub endlich hervordringet, und zum beobachten auf das Schieberglas geſchüttelt werden kan, davon doch Tages zuvor, nichts zu ſehen war. Anderer Bequemlichkeiten nicht zu gedenken, welche ein jeder Liebhaber alsdenn von ſelbſten, mit Vergnügen entdecken und bewundern wird.

Auſſitôt qu'on a coupé les Feuilles autour du Piſtil avec des Ciſeaux fins, on met le Pilier F. qu'on laiſſe à la Queuë de la Fleur, dans un verre d'eau tout de même comme on voit ici les Renoncules dans le verre ♀, & on les y tient un jour. Cela fait que les Aiguilles & les Anthêres s'elargiſſent; ils deviennent plus grands, croîſſent, & parviennent à leur maturité entiére, de ſorte que la Poudre Anthêrique pouſſe à la fin, & peut être jettée ſur un Verre, quoique on n'en ait rien vû la journée précédente. Sans parler des autres commodités que chaque Amateur decouvrira & admirera de ſoi même.

Ich nahm einen Staubträger M. von der dreyfachen Reihe H. derſelben welche den Piſtill L. umkränzen, und ſahe ihn Olivenfärbig mit Purpurrothen Rand N. durch No. 6.

J'ai pris un Porteur de la Poudre Antherique M. du triple Ordre de ces Feuilles H, qui entourent le Piſtil L, il étoit à voir par No. 6. couleur d'Olive, ayant une bordure pourprée N.

Die Griffel ſahen Purpurroth O. und unten wo ſie breiter waren und einen Beutel vorſtellten, erblickte ich inwendig den kleinen Embryo ganz weiß liegen. Es iſt alſo die Erhöhung L. nicht der Piſtill, wie ich anfänglich glaubte, ſondern nur die Säule gleichſam, zu nennen, auf welcher mehrere Piſtille ſtehen. Die Figur O. aber kan mit mehrern Recht als der wahre Piſtill beſchrieben werden, weil an derſelben alle Theile enthalten ſind, welche dazu erfordert werden. Denn die Narbe, die Warze oder das Stigma, beſtehet aus einer Menge kurzer Coniſcher Röhrchen P. deren Spize ich ſtark vergröſſert, bey Q. getreulich abgezeichnet habe und wie Kryſtall glänzen. Der Griffel iſt die Purpurrothe Röhre O; und der Uterus, der Eyerſtock, das Fruchtbehältnus oder wie man dieſen Theil nennen will, iſt der noch grüne Blaſenförmige Sack S. in welchem der Embryo T. eingehüllet iſt. Dergleichen Piſtille ſtehen ſehr viele um die Säule, auch darunter ſolche welche noch ſehr klein ſind R.; doch ſiehet man auch ſchon die Rudimenta des Embryons ebenfalls in dieſen kleinen liegen.

Les Aiguilles étoient couleur de Pourpre O. & je voyois en bas, où elles ſont plus larges & repréſentent une Bourſe, le petit Embrion couché intérièurement tout blanc. L'Elevation L. n'eſt donc point le Piſtil, comme je croyois d'abord, mais ſeulement le ſoûtien, ſur lequel pluſieurs Piſtils ſont plantés. On peut en revanche nommer la Fig. O. avec plus de raiſon le Piſtil, parce que toutes les Parties s'y trouvent, qui font le Piſtil. Car la Cicatrice, la Verruë ou le Stigme, conſiſte en une quantité de petits Tuyaux coniques P., la Pointe fort groſſie desquels j'ai exactement répréſenté litt. Q, lesquels Tuyaux brillent comme le Criſtal. Le Tuyau pourpré O. eſt l'Aiguille; & l'Uterus, l'Ovaire, le Garde-Semence, ou bien comme on veut nommer cette Partie, eſt le Sac S. encore verd, en forme de Veſſies, dans lequel l'Embrion T. eſt enveloppé. De ces Piſtils ſe trouve une grande quantité autour du Pilier, & il s'en trouve quelques uns, qui ſont encore fort petits R; on voit cependant malgré tout cela déja les rudiments des Embrions couchés de même dans ces petits.

Der Antherenſtaub iſt trocken, nicht ganz rund, ſondern ungleich als ein Pfefferkorn: Er wird aber im Waſſer kugelrund, und gibt ſehr langſam ſeine innerliche Subſtanz von ſich. S. Fig. U. V.

La Poudre Anthêrique n'eſt pas tout à fait ronde, mais inegale comme un grain de Poivre. Elle devient pourtant ronde dans l'eau, & rend fort lentement ſa ſubſtance intérieure. Voyès les fig. U. V.

Die dritte Ranunkel C. war feuerfarb und goldgelb geſtreift. Dieſe ſahe der Ranunkel B. an ihrer Säule ſehr ähnlich, ohngeachtet ſie mehr Blätter doch nicht ſo viele als A. gehabt hatte. Denn ſie war mit Antheren und

La troiſiéme Renoncule étoit Couleur de Feu & rayée couleur d'or. Celle-ci reſſembloit parfaitement à la Renoncule B. quant à ſon Pilier, malgré qu'elle avoit plus de Feuilles, mais pour-

und Piſtillen beſezt, davon ein Staubträger ſtark vergröſſert, bey W. angezeigt worden. Er war goldgelb, mit purpurrother Einfaſſung an beeden gedoppelten Beuteln, und zugleich mit Antherenſtaub innerlich angefüllt, der aber erſt nach 2. Tagen im Waſſer, aus den Beuteln hervorgebrochen iſt.

pourtant pas tant que la Renoncule A. Car elle étoit garnie d'Anthêres & de Piſtils, dont voici un Porteur de l'Anthêra fort groſſi ſous la lettre, W. Il étoit couleur d'or, aves des bordures doubles pourprées aux deux Bourſes doubles, & rempli intérieurement de la Poudre Anthêrique, mais qui n'eſt ſortie des Bourſes qu'après avoir reſtée deux jours dans de l'eau.

Die Griffel aber, konnte man hier keine Piſtille nennen, denn ſie hatten keinen Uterum und kein Fruchtbehältnus, auch nicht die geringſte Spuhr von Saamen, ſondern liefen, wie die Figur Oo. zeigt, unten auf beeden Seiten in einer Weite, gleich zuſammen. Die Säule war auch nicht ſpizig zu, ſondern oben mehr platt rund 8. Fig. X. und um dieſe ſtunden ſie nebeneinander eng beyſammen.

Mais on ne pouvoit pas ici nommer les Aiguilles, Piſtils, car elles n'avoient point de l'Uterus, & point de Garde-Semence, encore moins la moindre marque d'une Semence, mais elles ſe ſont jointes en bas de deux côtés, comme la fig. Oo. montre. Le Pilier n'étoit non plus pointu, mais plus rond. voy. la fig. X. & elles-étoient rangées fort dru autour de celui-ci.

Die vierdte Ranunkel D. ſo eine der ſchönſten und mit roſenfarben und purpurrothen zarten Linien, auf weiſſen Grund, geſtreift geweſen, war abermalen eine halb gefüllte, und hatte alle Befruchtungstheile, wie B. Ihre Säule habe ich bey Y. angezeigt, wie die Piſtille als rothe krumme Haken, auf ihr ruhen. Nimmt man aber dieſe herab, ſo ſiehet man die ablangen Vertiefungen in welchen ſie eingewachſen waren, und dann findet man die Säule wie Z. zeigt, mit zarten Grübgen und Haaren oder Wollenfaſern (c.) zugleich beſezt, wo unten um a. die Antheren, um b. aber, die Blätter der Corolle, zu ſtehen pflegen. Der Antherenſtaub war goldgelb, die Piſtille hatter ihre Embryonen gleich O. und S. und R. und die Staubbeutel waren ganz purpurroth.

La quatriéme Renoncule D., une de plus belles, qui étoit rayée des Lignes couleur de Roſe & pourprées ſur un fond blanc, étoit encore une Semi-double, & avoit les mêmes Parties genitâles comme B. J'ai marqué ſon Pilier Y, comme les Piſtils s'y répoſent en forme de Crochets rouges courbès. Lorsqu'on ôte ceux-ci, on voit alors les Cavités oblongues, dans lesquelles ils croîſſoient, & on trouve alors le Pilier, comme la fig. Z. montre, garni des creux, cheveux ou tendres Fibres de Laine (c) où communement en bas les Anthêres ſont plantés autour de l'a, & les Feuilles de la Corolle autour de b. la Poudre Anthêrique étoit couleur d'or, les Piſtils avoient ſes Embrions comme O. & S. & R., & les Bourſes de Poudre étoient pourprées.

Die fünfte Ranunkel aber E. ſo ſchwefelgelb und etwas in das grüne ſpielte, hatte eben die Unvollkommenheit als C. Sie iſt weder halb noch ganz gefüllt zu nennen geweſen, und trug dahero auch, wie ich vermuthe, unvollkommene Befruchtungstheile. Ob ich ſchon Griffel und Antheren an ihrer Säule entdeckte, und ob ſie gleich 3. 4. Tage im friſchen Waſſer ſteckte, ſo blieb doch der Antherenſtaub zurück, auch mangelten die Embryonen T. gänzlich. Die Griffel aber zeigten zwar unten bey S. einen bloſen ähnlichen Sack, der aber leer war und kein Germen ſehen laſſen.

La cinquiéme Renoncule F. qui étoit couleur de ſouffre & donnoit un peu dans le verd, avoit les mêmes defauts que C. Je ne la pouvois nommer ni Semi-double, ni Double, & portoit par cette raiſon, à ce que je crois, des Parties genitâles imparfaites. Malgré que j'ai découvert des Aiguilles & des Anthêres à ſon Pilier, & malgré qu'elle demeuroit 3. à 4. jours dans de l'eau fraiche, néanmoins la Poudre Anthêrique réſtoit en arriére, & les Embrions T. lui manquoient totalement. Les Aiguilles montroient bien en bas à S. un ſac en forme de Veſſies, mais qui étoit vuide, & ne donnoit voir le Germe.

Die Figur d. gibt den Kelch zu erkennen der aus fünf grünen vertieften Blättern beſtehet.

La Fig. d. fait connoître la Coupe, qui conſiſte en cinq feuilles creuſes & verdes.

Endlich glaubte ich, verſchiedenen Leſern reſpektive einen Gefallen zu erweiſen, wann ich auch noch die gemeine Wieſen-Ranunkel, (Ranunculus pratenſis) oder die ſogenannte Schmalzblume auf dieſer Tafel mit anbringen würde. Man nennet ſie auch wegen ihrer grünen Blätter am Stengel, den Hanenfuß, und ſoll ihren Namen von Rana haben, weil ſie an ſumpfigten Orten gerne wächſt, wo ſich Frösche aufzuhalten pflegen.

J'ai cru enfin faire plaiſir à mes Lecteurs, ſi j'ajoute à cette Table la Renoncule commune des Prés, (*Ranunculus Pratenſis.*) On la nomme auſſi en allemand (*Hanenfuſs*) à cauſe de ſes feuilles verdes à la Tige, & on derive ſon nom de (*Rana,*) (Grenouille) parce qu'elle croît volontiers dans des endroits marécageux, où les Grenouilles aiment à demeurer.

Sie blühet sehr schön und groß, in meinem Gärtgen und stark gefüllt, und ob sie schon eben so dichte voll Blätter sind als die rothen grossen Ranunkel, A. so tragen sie doch reifen Saamen, der ebenfalls in solchen krummen Hakengriffeln liegt als in den grosen Ranunkeln. Zu mehrer Deutlichkeit gibt e. eine gefüllte f. eine einfache Blume davon zu erkennen g'. Einen geschlossenen Knopf; h. Einen Saamenknopf mit seinen Haken-Pistillen, i. Ein Saamenbehältnus mit dem Haken-Griffel, k. Die untern breiten Blätter l. Die spizigen Blätter m. Der Stiel, der aber in der Mitte eingeschnitten, getheilt und mit einer starken durchlauffenden Röhre versehen ist.

Ich schmeichle mir, daß diese Beobachtung den Beyfall der Kenner erreichen möchte; und da ich so glücklich seyn werde, dieses zu erhalten, so gedenke ich das merkwürdige an denen Anemonen ebenfalls gründlich zu untersuchen und nechstens mitzutheilen.

Elle a une Fleur fort belle, grande, & double, & quoique ces Renoncules ont autant de feuilles que les plus grandes Renoncules rouges A., elles portent pourtant de la Semence mure, qui est de même couchée dans des Aiguilles courbées, comme dans les Renoncules grandes. Pour rendre ce que j'ai dit plus intelligible, j'ai répresenté par e. une Renoncule Double, par f. une Simple g., par h. un Bouton fermé; par i. un Bouton de Semence avec ses Pistils en forme de Crochets. Par k. un Garde-Semence avec ses Aiguilles en forme de Crochets, par l. les feuilles larges par en bas, par m. les Feuilles pointuës. La Queuë, mais qui est partagée au milieu en deux & qui a un Tuyau fort robuste qui le parcourt.

Je me flatte que ces Observations seront du Goût des Connoîsseurs, & si je puis obtenir cela, je publierai au plutôt possible ce que j'ai trouvé de plus rémarquable aux Anémones.

Erste Nota. Liebhabere so gerne lesen, belieben sowohl wegen der Bildung der Steinkerne in denen Früchten, als auch in Betracht der Ranunkeln, die Beobachtungen nachzusehen, welche der Freyherr von Wolff an obangeführten Ort, Grew, Malpigh, und *du Hamel* hierüber angestellt haben, und was sowohl bey *Pluche* im Spectacle de la Nature l. c. als auch in dem Traité des Renoncules und dem zweyten Band des Hamburgischen Magazins zu finden ist. Ich bitte alsdenn diese meine Erfahrungen und Zeichnungen dagegen zu halten, und zulezt von selbsten von dem Werth meiner Versuche zu urtheilen, ob ich etwas altes, überflüßiges oder abgeborgtes darinnen vorgetragen habe.

Zweyte Nota. Die Beobachtungen an dem Kirschenkerne habe ich hier mit einer noch sehr zarten Frucht von 14. Tagen angestellt, da der Keim noch nicht zu sehen ware, auch die Bildung der Steinschaale noch nicht geschahe. Weilen sich aber noch verschiedenes biß zur gänzlichen Reife entdecken lässet, so wird solches denen Liebhabern desto mehr Gelegenheit geben, diese Untersuchung selbst weiters fortzusetzen.

Prémière Note. Ceux qui aiment à lire, n'ont qu'à parcourir, pour ce qui regarde la Formation des Noyaux dans les Fruits & Renoncules, les Observations, qu'ont institué le Baron *Wolf*, dans l'endroit ci-dessus cité, *Grevv*, *Malpigh*, *du Hamel*, & ce qui se trouve dans le Spectacle de la Nature de Mr. Pluche que dans le Traité des Renoncules & dans le Tome 2. du Magazin d'Hambourg. Je supplie mes Lecteurs de vouloir bien confronter mes Experiences et Desseins avec celles-ci et juger enfin de la bonté de mes Essais, et voir si j'ai donné du vieux, superflu ou emprunté.

Deuxiéme Note. J'ai institué l'Observation des Noyaux de la Cerise moyennant un Fruit fort tendre agé de quinze jours, où on ne pouvoit pas encore voir le Germe et où la Formation du Noyau ne s'étoit pas encore faite. Mais comme il reste à découvrir encore bien de Choses jusqu'à sa maturité totale. Les amateurs du Microscopes auront une belle occasion, pour decouvrir encorce ce qu'ils reste.

Ordnung der Tafeln.

I.	Die Apfelbaumblüthe	pag. 4
II.	Die Reseda	8
III.	Die Gold- oder Feuerlilie	10
IV.	Die Birnblüte	22
V.	Die Martagon oder Heydnische Linie	24
VI.	Ein blauer Stern-Hyacint	26
VII.	Blüth und Holz vom Weinstock	28
VIII.	Die blaue Schwertlilie, mit dem rothen kleinen Lilienkäfer	32
IX.	Nähere Vorstellung der Befruchtungs-Theile an den Rosen ꝛc.	34
X. und XI.	Die Kirsche mit ihrer Blüth	42
XII.	Das merkwürdige an den gefüllten Ranunkeln.	48

Ordre des Planches.

I.	La Fleur du Pommier	page 4
II.	La Reseda	
III.	Le Lis couleur de feu ou d'or	10
IV.	La Fleur du Poirier	22
V.	La Martagon ou Lis Payen	24
VI.	Une sacinte d'Etoiles bleue	26
VII.	La Fleur & le Bois de la Vigne	28
VIII.	La Glayeul bleu, avec le petit Hanneton rouge de Lis	32
IX.	Répresentation plus précise des Parties Genitâles aux Rose	34
X. & XI.	La Cerise, sa Fleur & son Fruit &c.	42
XII.	Les Choses les plus remarquables aux Renoncules Doubles	48

TAB. XII.



M.F.L. del.

A.L.W. Sc.